

க.பொ.த.(உ /த)பரீட்சை - 2019

02- இரசாயனவியல்

புள்ளிகளின் பரம்பல்

பத்திரம் I : $1 \times 50 = 50$

பத்திரம் II :

பகுதி A : $100 \times 4 = 400$

பகுதி B : $150 \times 2 = 300$

பகுதி C : $150 \times 2 = 300$

மொத்தம் $= 1000$

பத்திரம் II இறுதிப்புள்ளி $= 100$

PAPERMASTER.LK

விடைத்தாள்களுக்குப் புள்ளியிடல் - பொது நுட்ப முறைகள்

விடைத்தாள்களுக்குப் புள்ளியிடும் போதும், புள்ளிப்பட்டியலில் புள்ளிகளைப் பதியும் போதும் ஓர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறையைக் கடைப்பிடித்தல் கட்டாயமானதாகும். அதன்பொருட்டு பின்வரும் முறையில் செயற்படவும்.

1. விடைத்தாள்களுக்குப் புள்ளியிடுவதற்கு சிவப்பு நிற குமிழ்முனை பேனாவை பயன்படுத்தவும்.
2. சகல விடைத்தாள்களினதும் முதற்பக்கத்தில் உதவிப் பரீட்சகரின் குறியீட்டெண்ணைக் குறிப்பிடவும். இலக்கங்கள் எழுதும்போது தெளிவான இலக்கத்தில் எழுதவும்.
3. இலக்கங்களை எழுதும்போது பிழைகள் ஏற்பட்டால் அவற்றைத் தனிக்கோட்டினால் கீறிவிட்டு, மீண்டும் பக்கத்தில் சரியாக எழுதி, சிற்றொப்பத்தை இடவும்.
4. ஒவ்வொரு வினாவினதும் உபபகுதிகளின் விடைகளுக்காக பெற்றுக்கொண்ட புள்ளியை பதியும் போது அந்த வினாப்பகுதிகளின் இறுதியில் இன் உள் பதியவும். இறுதிப் புள்ளியை வினா இலக்கத்துடன் இன் உள் பின்னமாகப் பதியவும். புள்ளிகளைப் பதிவதற்கு பரீட்சகர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிரலை உபயோகிக்கவும்.

உதாரணம் - வினா இல 03

(i)	✓	
.....		
.....		
(ii)	✓	
.....		
.....		
(iii)	✓	
.....		
.....		

(03) (i) $\frac{4}{5}$ + (ii) $\frac{3}{5}$ + (iii) $\frac{3}{5}$ =

10
15

பல்தேர்வு விடைத்தாள் (துளைத்தாள்)

1. க.பொ.த.(உ. தற்) மற்றும் தகவல் தொழிநுட்பப் பரீட்சைக்கான துளைத்தாள் திணைக்களத்தால் வழங்கப்படும். சரியாக துளையிட்டு அத்தாட்சிப்படுத்திய துளைத்தாள் தங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும். அத்தாட்சிப்படுத்திய துளைத்தாளைப் பயன்படுத்துவது பரீட்சகரின் கடமையாகும்.
2. அதன் பின்னர் விடைத்தாளை நன்கு பரிசீலித்துப் பார்க்கவும். ஏதாவது வினாவுக்கு, ஒரு விடைக்கும் அதிகமாக குறியிட்டிருந்தாலோ, ஒரு விடைக்காவது குறியிடப்படாமலிருந்தாலோ தெரிவுகளை வெட்டிவிடக்கூடியதாக கோடொன்றைக் கீறவும். சில வேளைகளில் பரீட்சார்த்தி முன்னர் குறிப்பிட்ட விடையை அழித்துவிட்டு வேறு விடைக்குக் குறியிட்டிருக்க முடியும். அவ்வாறு அழித்துள்ள போது நன்கு அழிக்காது விட்டிருந்தால், அவ்வாறு அழிக்கப்பட்ட தெரிவின் மீதும் கோடிடவும்.
3. துளைத்தாளை விடைத்தாளின் மீது சரியாக வைக்கவும். சரியான விடையை ✓ அடையாளத்தாலும் பிழையான விடையை ○ அடையாளத்தாலும் இறுதி நிரலில் அடையாளமிடவும். சரியான விடைகளின் எண்ணிக்கையை அவ்வவ் தெரிவுகளின் இறுதி நிரையின் கீழ் அத்துடன் அவற்றை கூட்டி சரியான புள்ளியை உரிய கட்டத்தில் எழுதவும்.

கட்டமைப்பு கட்டுரை விடைத்தாள்கள்

1. பரீட்சார்த்திகளால் விடைத்தாளில் வெறுமையாக விடப்பட்டுள்ள இடங்களையும், பக்கங்களையும் குறுக்குக் கோட்டு வட்டிவிடவும். பிழையான பொருத்தமற்ற விடைகளுக்குக் கீழ் கோட்டிவும். புள்ளி வழங்கக்கூடிய இடங்களில் ✓ அடையாளமிட்டு அதனைக் காட்டவும்.
2. புள்ளிகளை ஒவலண்ட் கடதாசியின் இடது பக்கத்தில் குறிக்கவும்.
3. சகல வினாக்களுக்கும் கொடுத்த முழுப் புள்ளியை விடைத்தாளின் முன் பக்கத்திலுள்ள பொருத்தமான பெட்டியினுள் வினா இலக்கத்திற்கு நேராக 2 இலக்கங்களில் புதியவும். வினாத்தாளில் உள்ள அறிவுறுத்தலின் படி வினாக்கள் தெரிவு செய்யப்படல் வேண்டும். எல்லா வினாக்களினதும் புள்ளிகளும் முதல் பக்கத்தில் புதியப்பட்ட பின் விடைத்தாளில் மேலதிகமாக எழுதப்பட்டிருக்கும் விடைகளின் புள்ளிகளில் குறைவான புள்ளிகளை வெட்டி விடவும்.
4. மொத்த புள்ளிகளை கவனமாக கூட்டி முன் பக்கத்தில் உரிய கூட்டில் புதியவும். விடைத்தாளில் வழங்கப்பட்டுள்ள விடைகளுக்கான புள்ளியை மீண்டும் பரிசீலித்த பின் முன்னால் புதியவும். ஒவ்வொரு வினாக்களுக்கும் வழங்கப்படும் புள்ளிகளை உரிய விதத்தில் எழுதுவும்.

புள்ளிப்பட்டியல் தயாரித்தல்

இம்முறை சகல பாடங்களுக்குமான இறுதிப்புள்ளிகுமுவினுள் கணிப்பிடப்படமாட்டாது. இதுதவிர ஒவ்வொரு வினாப் பத்திரத்துக்குமான இறுதிப்புள்ளி தனித்தனியாக புள்ளிப்பட்டியலில் புதியப்பட வேண்டும். பத்திரம் I ற்கான பஸ்தேர்வு வினாப்பத்திரம் மட்டும் இருப்பின் புள்ளிகள் இலக்கத்திலும் எழுத்திலும் புதியப்பட வேண்டும். 51 சித்திரப் பாடத்திற்குரிய I, II, மற்றும் III ஆம் வினாப்பத்திரங்களுக்குரிய புள்ளிகளை தனித்தனியாக புள்ளிப்பட்டியலில் பதிந்து எழுத்திலும் எழுதுதல் வேண்டும்.

o o o

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය/ க.பொ.த. (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2019

නව නිර්දේශය/ புதிய பாடத்திட்டம்

විෂය අංකය
பாட இலக்கம்

02

විෂයය
பாடம்

இரசாயனவியல்

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය/புள்ளி வழங்கும் திட்டம்

I පත්‍රය/பத்திரம் I

ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.
01.	1 -----	11.	1 -----	21.	1 -----	31.	1 -----	41.	-----
02.	5 -----	12.	1 -----	22.	1 -----	32.	1 -----	42.	1 -----
03.	-----	13.	1 -----	23.	1 -----	33.	1 -----	43.	1 -----
04.	4 -----	14.	1 -----	24.	1 -----	34.	1 -----	44.	1 -----
05.	1 -----	15.	1 -----	25.	1 -----	35.	1 -----	45.	1 -----
06.	1 -----	16.	1 -----	26.	1 -----	36.	1 -----	46.	1 -----
07.	1 -----	17.	1 -----	27.	1 -----	37.	1 -----	47.	1 -----
08.	1 -----	18.	1 -----	28.	1 -----	38.	1 -----	48.	1 -----
09.	1 -----	19.	1 -----	29.	1 -----	39.	1 -----	49.	1 -----
10.	1 -----	20.	1 -----	30.	1 -----	40.	1 -----	50.	1 -----

❖ විශේෂ උපදෙස්/ விசேட அறிவுறுத்தல் :

එක් පිළිතුරකට/ ஒரு சரியான விடைக்கு 01 ලකුණු බැගින්/புள்ளி வீதம்

இரண்டு/மொத்தப் புள்ளிகள் 1 × 50 = 50

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை



நான்கு வினாக்களுக்கும் விடைகளை இத்தாளிலேயே எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 100 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

1. (a) பின்வரும் வினாக்கள் ஆவர்த்தன அட்டவணையின் இரண்டாம் ஆவர்த்தனத்தில் உள்ள மூலகங்களுடன் தொடர்புபட்டவை. (i) தொடக்கம் (vi) வரையுள்ள பகுதிகளுக்கு விடை எழுதும்போது வழங்கப்பட்டுள்ள வெளியில் மூலகத்தின் குறியீட்டை எழுதுக.

- (i) மிகக் கூடிய மின்னெதிர்த்தன்மை உள்ள மூலகத்தை இனங்காண்க F
(விழுமிய வாயுவைப் புறக்கணிக்க).
- (ii) மின்னைக் கடத்தும் பிறதிருப்ப வடிவம் உள்ள மூலகத்தை இனங்காண்க. C
- (iii) அளவில் மிகப் பெரிய ஓரணு அயனை உண்டாக்கும் மூலகத்தை இனங்காண்க (இவ்வயன் உறுதியான அயனாக இருக்க வேண்டும்). N
- (iv) p இலத்திரன்கள் இல்லாத, ஆனால் ஓர் உறுதியான s நிலையமைப்பு உள்ள மூலகத்தை இனங்காண்க. Be
- (v) மிகக் கூடிய முதலாம் அயனாக்கச் சக்தி உள்ள மூலகத்தை இனங்காண்க. Ne
- (vi) பெரும்பாலும் இலத்திரன் குறைபாட்டுத் தள முக்கோணப் பங்கீட்டுவலுச் சேர்வைகளை உண்டாக்கும் மூலகத்தை இனங்காண்க. B



l(a) : (04x6) புள்ளிகள்

(b) (i) மூலக்கூறு SO_3F_2 இற்கு மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க லூயிசின் புள்ளி-கோட்டுக் கட்டமைப்பை வரைக. அதன் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது.




(06)

(ii) மூலக்கூறு $\text{H}_3\text{N}_3\text{O}$ இற்கு மிகவும் உறுதியான லூயிசின் புள்ளி-கோட்டுக் கட்டமைப்பு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. இம்மூலக்கூறுக்கு மேலும் இரண்டு லூயிசின் புள்ளி-கோட்டுக் கட்டமைப்புகளை (பரிவுக் கட்டமைப்புகளை) வரைக. நீர் வரைந்த மிக உறுதியற்ற கட்டமைப்பின் கீழ் 'உறுதியற்றது' என எழுதுக.



(04)




(04)

(உறுதியற்றது)


(02)

PAPERMASTER.LK

- (iii) பின்வரும் லூயிசின் புள்ளி-கோட்டுக் கட்டமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள C, N, O அணுக்களின்
- அணுவைச் சுற்றி உள்ள VSEPR சோடிகள்
 - அணுவைச் சுற்றி உள்ள இலத்திரன் சோடிக் கேத்திரகணிதம்
 - அணுவைச் சுற்றி உள்ள வடிவம்
 - அணுவின் கலப்பாக்கம்
- ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுக.



அணுக்கள் பின்வருமாறு இலக்கமிடப்பட்டுள்ளன.



		O ¹	N ²	C ³	N ⁴
I	VSEPR சோடிகள்	4	3	2	3
II	இலத்திரன் சோடிக் கேத்திர கணிதம்	நான்முகி	தளமுகக்கோணம்	நேர்கோடு	தளமுகக்கோணம்
III	வடிவம்	கோண / V	கோண / V	நேர்கோடு	தளமுகக்கோணம்
IV	கலப்பு	sp^3	sp^2	sp	sp^2

(01 X 16 = 16)

- (iv) மேலே (iii) இல் தரப்பட்ட லூயிசின் புள்ளி-கோட்டுக் கட்டமைப்பில் பின்வரும் σ பிணைப்புகள் உண்டாவதுடன் சம்பந்தப்பட்ட அணு / கலப்பின ஒபிற்றல்களை இனங்காண்க (அணுக்களை இலக்கமிடல் (iii) இல் உள்ளவாறாகும்).

I. F—O ¹	F	$2p$ or sp^3	O ¹	sp^3
II. O ¹ —N ²	O ¹	sp^3	N ²	sp^2
III. N ² —C ³	N ²	sp^2	C ³	sp
IV. C ³ —N ⁴	C ³	sp	N ⁴	sp^2
V. N ⁴ —O ⁵	N ⁴	sp^2	O ⁵	$2p$ or sp^3
VI. N ⁴ —Cl	N ⁴	sp^2	Cl	$3p$ or sp^3

(01 X 12 = 12)

- (v) மேலே (iii) இல் தரப்பட்ட லூயிசின் புள்ளி-கோட்டுக் கட்டமைப்பில் பின்வரும் π பிணைப்புகள் உண்டாவதுடன் சம்பந்தப்படும் அணு ஒபிற்றல்களை இனங்காண்க (அணுக்களை இலக்கமிடல் (iii) இல் உள்ளவாறாகும்).

I. N ² —C ³	N ²	$2p$	C ³	$2p$
II. C ³ —N ⁴	C ³	$2p$	N ⁴	$2p$

(01 X 4 = 04)

- (vi) I. மேலே (iii) இல் தரப்பட்ட லூயிசின் புள்ளி-கோட்டுக் கட்டமைப்பில் இரு இரட்டைப் பிணைப்புகள் எங்ஙனம் சார்நிலைப்பட்டிருக்கும்?

இரட்டைப்பிணைப்புக்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை

(02)

அல்லது

சிக்மாப் பிணைப்பு நேர்கோடு, π பிணைப்புகள் செங்குத்தானவை

(01 + 01)

- II. இதனை ஒத்த ஒரு சார்நிலை உள்ள இரட்டைப் பிணைப்புகள் இருக்கும் ஒரு மூலக்கூறுக்கு /
அயனுக்கு ஓர் உதாரணம் தருக.
 CO_2 , NO_2^+

(02)

குறிப்பு: உமது உதாரணத்தில் 3 இற்கு மேற்பட்ட அணுக்கள் இடம்பெறக்கூடாது.
உமது உதாரணத்தில் உள்ள மூலகங்கள் ஆவர்த்தன அட்டவணையின் முதலாம்,
இரண்டாம் ஆவர்த்தனங்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

I(b) : 52 புள்ளிகள்

- (c) (i) n, l, m_l என்னும் மூன்று சக்திச் சொட்டென்களில் ஓர் அணு ஓபிற்றல் விவரிக்கப்படுகிறது.
உரிய சக்திச் சொட்டென்களையும் அணு ஓபிற்றலின் பெயரையும் பின்வரும் பெட்டிகளில் எழுதுக.

	n	l	m_l	அணு ஓபிற்றல்
I.	3	1	+1	3p
II.	3	2	-2	3d
III.	2	0	0	2s

(01 X 6 = 06)

- (ii) அடைப்புக்குறிகளில் காட்டப்பட்டுள்ள இயல்பு அதிகரிக்கும் வரிசையில் பின்வருவனவற்றை
ஒழுங்குபடுத்துக (காரணங்கள் அவசியமில்லை).

I. LiF, LiI, KF (உருகுநிலை)

___LiI___ < ___LiF___ < ___KF___

II. NO_2^- , NO_4^{3-} , NF_5 (உறுதிநிலை)

___NF₅___ < ___NO₄³⁻___ < ___NO₂⁻___

III. NOCl, NOCl₃, NO₂F (N-O பிணைப்புத் தூரம்)

___NOCl___ < ___NO₂F___ < ___NOCl₃___

(06 X 3 = 18)

I(c) : 24 புள்ளிகள்

2. (a) **X** என்பது ஆவர்த்தன அட்டவணையில் உள்ள ஓர் s-தொகுப்பு மூலகமாகும். **X** இன் முதலாம், இரண்டாம், மூன்றாம் அயனாக்கச் சக்திகள் kJ mol^{-1} இல் முறையே 738, 1451, 7733 ஆகும். **X** ஆனது வெந்நீருடன் மெதுவாகத் தாக்கம் புரிந்து $\text{H}_2(\text{g})$ ஐ விடுவித்து அதன் ஐதரோட்சைட்டையும் உண்டாக்குகிறது. அந்த ஐதரோட்சைட்டு ஒரு மூலமாகும். **X** ஆனது ஐதான அமிலங்களுடன் தாக்கம் புரியும்போதும் $\text{H}_2(\text{g})$ ஐ விடுவிக்கின்றது. **X** ஆனது வளியில் ஒரு பிரகாசமான வெள்ளொளியுடன் எரிகின்றது. நீரின் வன்மைக்கு **X** இன் கற்றயன் பங்களிப்புச் செய்கின்றது.

(i) **X** ஐ இனங்காண்க. **X**: **Mg** (07)

(ii) **X** இன் தரை நிலை இலத்திரன் நிலையமைப்பை எழுதுக. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ (04)

(iii) **X** ஆனது வளியில் எரியும்போது உண்டாகும் இரண்டு சேர்வைகளின் இரசாயனச் சூத்திரங்களை எழுதுக.

..... **MgO** , **Mg₃N₂** ஆகியன. (03 + 03)

(iv) ஆவர்த்தன அட்டவணையில் **X** அடங்கும் கூட்டத்தில் உள்ள மூலகங்களின் தரப்பட்ட சேர்வைகளைக் கருதுக. கூட்டத்தில் கீழ்நோக்கிச் செல்கையில் காட்டப்பட்டுள்ள இயல்பு அதிகரிக்கின்றதா, குறைகின்றதா எனத் தரப்பட்டுள்ள பெட்டிகளில் எழுதுக.

I. நீரில் சல்பேற்றுகளின் கரைதிறன்

குறையும்

(03)

II. நீரில் ஐதரோட்சைட்டுகளின் கரைதிறன்

கூடும்

(03)

III. உலோகக் காபனேற்றுகளின் வெப்ப உறுதிநிலை

கூடும்

(03)

III இல் உள்ள உமது விடைக்குக் காரணங்களைத் தருக.

ஏற்றம் சமமானது, கூட்டம் வழியே கீழ் நோக்கி கற்றயனின் பருமன் கூடும் (03)

அல்லது

கூட்டம் வழியே கீழ் நோக்கி ஏற்ற அடர்த்தி குறையும்.

ஆகவே, கூட்டம் வழியே கீழ் நோக்கி முனைவாக்க வலு குறையும். (02)

எனவே கூட்டம் வழியே கீழ் நோக்கி காபனேற்றின் பிரிகை/ உடைதல் கடினமாகும். (03)

- (v) $H_2(g)$, $O_2(g)$, $N_2(g)$ ஆகியவற்றுடன் X ஐ ஒத்த ஒரு விதத்தில் தாக்கம் புரியும், ஆனால் X அடங்கும் கூட்டத்திற்கு உரியதாக அமையாத ஆவர்த்தன அட்டவணையின் s-தொகுப்பின் மூலகத்தை இனங்காண்க.

இலத்தியம் அல்லது Li

(04)

- (vi) நீரின் வன்மைக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் வேறோர் உலோக அயனை இனங்காண்க.

Ca^{2+}

(04)

- (vii) நீரின் வன்மையை அகற்றுவதற்குப் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் சேர்வையை இனங்காண்க.

Na_2CO_3

(04)

- (viii) சேதன இரசாயனவியலில் நன்றாக அறியப்பட்ட ஒரு சோதனைப் பொருளின் ஒரு கூறு X ஆகும். இச்சோதனைப் பொருளின் பெயரைத் தருக.

கிரிநாட்டின் சோதனைப் பொருள்

(04)

குறிப்பு: X ஆனது தவறாயின் (a)(ii) – (iv) இற்கு புள்ளிகள் வழங்க வேண்டாம்

2(a) : 50 புள்ளிகள்

- (b) A தொடக்கம் E வரைக்கும் பெயரிடப்பட்டுள்ள சோதனைக் குழாய்களில் $Na_2S_2O_3$, Na_2CO_3 , KNO_2 , KBr , Na_2S ஆகியவற்றின் (இதே வரிசையில்ன்றி) நீர்க் கரைசல்கள் உள்ளன. A தொடக்கம் E வரையுள்ள ஒவ்வொரு சோதனைக் குழாயிலும் ஐதான HCl ஐச் சேர்க்கும்போது (தேவையெனின் இளஞ்சூடாக்குவதன் மூலம்) கிடைக்கும் கரைசல்களினதும் வெளிவரும் வாயுக்களினதும் இயல்புகள் பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

சோதனைக் குழாய்	கரைசலின் தோற்றம்	வாயு
A	நிறமற்றது	நிறமும் மணமும் இல்லை
B	நிறமற்றது	செங்கபில நிறமும் காரமான மணமும் உண்டு
C	நிறமற்றது	நிறமற்றது; கூழ்முட்டையின் மணம் உள்ளது
D	கலங்கற்றன்மை உள்ளது	நிறமற்றது; காரமான மணம் உண்டு
E	நிறமற்றது	வெளிவருவதில்லை

- (i) A தொடக்கம் E வரையுள்ள சோதனைக் குழாய்கள் ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள கரைசல்களை இனங்காண்க.

A: Na_2CO_3

B: KNO_2


C: Na_2S

D: $Na_2S_2O_3$

E: KBr

(04 X 5 = 20)



- (ii) **A, B, C, D** ஆகிய சோதனைக் குழாய்களில் நடைபெறும் தாக்கங்களுக்குரிய சமன்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாடுகளை எழுதுக.



அல்லது



அல்லது



(04 X 4 = 16)

- (iii) **A, C, D** ஆகியவற்றில் வெளிவரும் வாயுக்கள் ஒவ்வொன்றையும் இனங்காண்பதற்கு ஓர் இரசாயனச் சோதனை வீதம் எழுதுக.

குறிப்பு : அவதானிப்புகளும் தேவை.

A இல்: CO_2

Ca(OH)_2 கரைசலினூடாகச் செலுத்துதல் (02)

கரைசல் பால்நிறமாகும், தொடர்ந்து செலுத்தப் பால்நிறம் அற்றுப்போகும். (02)

C இல் : H_2S

ஈய அசுரேற்றுக் கரைசலில் ஈரமாக்கப்பட்ட வடிதாளுடன் சோதிக்கப்பட்டது (03)

வடிதாள் கறுப்பு நிறமாக மாறும். (02)

அல்லது

அமில KMnO_4 கரைசலினூடாக செலுத்துதல் (03)

செவ்வூதாக்க கரைசல் நிறமற்றுப் போகும். ஆனால் கரைசல் தெளிவற்றது. (புகாரானது) (02)

அல்லது

அமில $K_2Cr_2O_7$ கரைசலினூடாக செலுத்துதல் (03)
 செம்மஞ்சள் நிறக்கரைல் பச்சை நிறமாகும். ஆனால் கரைசல் தெளிவற்றது (02)
 (புகாரானது)

D இல் : SO_2

அமில $KMnO_4$ கரைசலினூடாக செலுத்துதல் (03)
 செவ்வூதாக்க கரைசல் நிறமற்றுப் போகும் (02)

அல்லது

அமில $K_2Cr_2O_7$ கரைசலினூடாகச் செலுத்துதல். (03)
 செம்மஞ்சள் நிறக்கரைல் பச்சை நிறமாகும்.. (02)

அல்லது

$Ca(OH)_2$ கரைசலினூடாகச் செலுத்துதல் (03)
 கரைசல் பால்நிறமாகும், தொடர்ந்து செலுத்தப் பால்நிறம் அற்றுப்போகும். (02)


அல்லது

ஈரமான நிறப்பூவிதழுடன் சோதித்தல் (03)
 இதழ் நிறமற்றுப் போகும்./ வெளிறும் (02)

குறிப்பு: (b)(ii) மற்றும் (b)(iii) இற்கு புள்ளிகள் வழங்கப்படுவதற்கு (b)(i) இல்
 அடையாளப்படுத்தல் சரியாக இருத்தல் வேண்டும்.

2 (b) : 50 புள்ளிகள்

3. நீரில் $MX(s)$ இன் கரைதலுடன் தொடர்புபட்ட வெப்ப மாற்றத்தைக் கணிப்பதற்கு உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள ஒழுங்கமைப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. காய்ச்சி வடித்த நீரின் 100.00 cm^3 ஆனது கிண்ணத்தில் சேர்க்கப்பட்டது. காய்ச்சி வடித்த நீரின் தொடக்க வெப்பநிலை 25.0°C என அளக்கப்பட்டது. பின்னர் $MX(s)$ இன் 0.10 mol ஆனது நீருடன் சேர்க்கப்பட்டுத் தொடர்ச்சியாகக் கலக்கப்பட்டது. கரைசலின் வெப்பநிலை படிப்படியாகக் குறைவதாக அவதானிக்கப்பட்டது. அளக்கப்பட்ட மிகக் குறைந்த வெப்பநிலை 17.0°C ஆக இருந்தது. பயன்படுத்திய நீரின் அளவானது $MX(s)$ ஐ முற்றாகக் கரையச் செய்வதற்குப் போதியதாக இருந்தது. நீரின் அடர்த்தியும் தன்வெப்பக் கொள்ளளவும் முறையே 1.00 g cm^{-3} , $4.20 \text{ J g}^{-1}^\circ \text{C}^{-1}$ ஆகும். $MX(s)$ கரைவதனால் நீரின் அடர்த்தியும் தன்வெப்பக் கொள்ளளவும் மாறுவதில்லையெனக் கொள்க.



- (i) தொகுதியை (கரைசல்) மறுபடியும் 25.0°C இற்குக் கொண்டுவருவதற்கு வழங்க வேண்டிய வெப்பத்தின் அளவைக் கணிக்க.

$$q = m s \Delta T \text{ (or } q = m c \Delta T) \quad (5)$$

$$= 100.00 \text{ cm}^3 \times 1.0 \text{ g cm}^{-3} \times 4.2 \text{ J }^\circ \text{C}^{-1} \text{ g}^{-1} \times (25.0 - 17.0)^\circ \text{C} \quad (4+1)+(4+1)+(4+1)+(4+1)$$

$$= 3360 \text{ J} \quad (4+1)$$

- (ii) நீரில் $MX(s)$ கரைதல் ஓர் அகவெப்பச் செயன்முறையா, புறவெப்பச் செயன்முறையா? உமது விடையை விளக்குக.

அகவெப்பத்தாக்க செயல்முறை (2)

$MX(s)$ கரையும் போது வெப்பத்தை உறுஞ்சும் (அல்லது நீரின் வெப்பநிலை குறைவடையும்) (2)

- (iii) தாக்கம் $\text{MX(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{M}^+(\text{aq}) + \text{X}^-(\text{aq})$ உடன் தொடர்புபட்ட வெப்பவுள்ளுறை மாற்றத்தை (kJ mol^{-1} இல்) கணிக்க.

$$\Delta H = 3360 \text{ J}$$

$$0.10 \text{ mol}$$

$$= 33.6 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ (or } 33600 \text{ J mol}^{-1}\text{)}$$

(4+1)+(4+1)

(4+1)

- (iv) 200.00 cm^3 நீரைப் பயன்படுத்தி இப்பரிசோதனை செய்யப்பட்டால், வெப்பநிலை மாற்றம் மேற்குறித்த பெறுமானத்திலும் கூடியதாக இருக்குமென நீர் எதிர்பார்க்கின்றீரா? உமது விடையை விளக்குக.

இல்லை (அல்லது வெப்பநிலை வித்தியாசம் சிறிதாக இருக்கும்)

(2)

வெப்பத்தின் அளவு (q) மாறிலி ஆகும், திணிவு (m) அதிகரிக்கும்


ஆகவே, வெப்பநிலை மாற்றம் (ΔT) சிறிதாக இருக்கும்

(அல்லது வெப்பத்தை வெளியேற்ற அதிகளவு நீர் உள்ளது)

(2)

- (v) தொகுதியின் (கரைசலின்) வெப்பநிலை மாறும் விதத்தை வெப்பநிலை - நேர வளையியை வரைவதன் மூலம் காட்டுக.

குறிப்பு : இறுதியில் தொகுதி அறை வெப்பநிலைக்கு (25.0°C) வருகின்றது.



வளையி $t=0$ இல் ஆரம்பிக்கும் (அல்லது உப்பு

சேர்க்கப்படும் நேரம் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்)

(2)

வளையி 25°C இல் இருந்து ஆரம்பிக்கும்

(2)

வளையி 17°C வரை கீழிறங்கும்

(2)

வளையி சரியான அமைப்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்

(4)

- (vi) இப்பரிசோதனையில் உலோகக் கிண்ணத்திற்குப் பதிலாகப் பிளாத்திக்குக் கிண்ணம் ஏன் பயன்படுத்தப்படுகின்றதென விளக்குக.

உலோகங்கள் சிறந்த வெப்பக் கடத்திகளாகும். (அல்லது வெப்பநிலை குறைவடையும் போது,

உலோகம் வெப்பத்தை வழங்கும் அத்துடன் சூழலில் இருந்து வெப்பத்தைக் கடத்தும்)

(2)

பிளாத்திக்குகள் வெப்ப அரிதிற் கடத்திகளாகும் அத்துடன் குறைந்த வெப்பக்கொள்ளளவை

உடையவை.

(2)

- (vii) 25.0°C வெப்பநிலையிலும் 1.0 atm அழுக்கத்திலும் நீரில் MX(s) கரைவதற்குக் கிப்ஸ் சக்தி மாற்றம் (ΔG) ஆனது $-26.0 \text{ kJ mol}^{-1}$ எனக் கணிக்கப்பட்டது. மேலே கணிக்கப்பட்ட வெப்பவுள்ளுறை மாற்றத்தைப் பயன்படுத்தி 25.0°C இலே நீரில் MX(s) இன் கரைதலுக்கு எந்திரப்பி மாற்றம் (ΔS) ஐக் கணிக்க.

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

(5)

$$\Delta S = \frac{\Delta H - \Delta G}{T}$$

$$= \frac{33.6 \text{ kJ mol}^{-1} - (-26.0 \text{ kJ mol}^{-1})}{298 \text{ K}}$$

(4+1)+(4+1)+(4+1)

$$= 200 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

(4+1)

PAPERMASTER.LK

(viii) வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது $MX(s)$ இன் கரைதிறன் அதிகரிக்கும் அல்லது குறையும் என நீர் எதிர்பார்ப்பீர்? உமது விடைக்குக் காரணங்களைத் தருக.

வெப்பநிலை அதிகரிப்புடன் நீரில் $MX(s)$ இன் கரைதிறன் அதிகரிக்கிறது (4)


ஏனெனில் ΔG உயர் மறைப்பெறுமானத்தை அடையும்.

(அல்லது $MX(s)$ இன் கரைதல் செயல்முறை ஓர் அகவெப்பத்தாக்கமாகும்) (4)


3: 100 புள்ளிகள்

4. (a) **A, B** ஆகிய சேர்வைகள் இரண்டிற்கும் ஒரே மூலக்கூற்றுச் சூத்திரம் $C_5H_{10}O$ உண்டு. **A, B** ஆகிய இரு சேர்வைகளும் 2, 4 இருநைத்திரோபீனைல்ஹைட்ரேசீனுடன் செம்மஞ்சள் / சிவப்பு வீழ்படிவைத் தருகின்றன. **A, B** ஆகியன மெதனோல் ஊடகத்தில் $NaBH_4$ உடன் வேறுவேறாகத் தாக்கம் புரியச் செய்யப்பட்டபோது சேர்வை **A** இலிருந்து **C** கிடைக்கும் அதே வேளை சேர்வை **B** இலிருந்து **D** கிடைக்கின்றது. **C** ஆனது Al_2O_3 உடன் வெப்பமாக்கப்படும்போது **E** (C_5H_{10}), **F** (C_5H_{10}) என்னும் இரு அற்கீன்கள் உண்டாகின்றன. **E, F** ஆகியன செறிந்த H_2SO_4 உடன் வேறுவேறாகத் தாக்கம் புரியச் செய்யப்பட்டு, கிடைக்கும் விளைபொருள்கள் நீர்ப்பகுப்புச் செய்யப்பட்டபோது சேர்வை **E** இலிருந்து **G** கிடைக்கும் அதே வேளை சேர்வை **F** இலிருந்து **H** கிடைக்கின்றது. **G** ஆனது லூக்காஸ் சோதனைப் பொருளுடன் உடனடியாக ஒரு கலங்கற்றன்மையைத் தருகின்றது. **H** உம் லூக்காஸ் சோதனைப் பொருளுடன் ஒரு கலங்கற்றன்மையைத் தருகின்றபோதிலும் அது உடனடியாக நடைபெறுவதில்லை.

(i) **G, H** ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளை வரைக.




G




H

(05 x 2 = 10)


(ii) **A, C, E, F** ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளை வரைக.




A



C



E




F


(05 x 4 = 20)

D ஆனது Al_2O_3 உடன் வெப்பமாக்கப்படும்போது அற்கீன் **I** (C_5H_{10}) கிடைக்கின்றது. **I** ஆனது செறிந்த H_2SO_4 உடன் தாக்கம் புரியச் செய்யப்பட்டு, கிடைக்கும் விளைபொருளை நீர்ப்பகுப்புச் செய்யும்போது **G** கிடைக்கின்றது.


(iii) **B, D, I** ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளை வரைக.



B



D



I

(05 x 3 = 15)

குறிப்பு: **A - I** வரை சுயாதீனமாக புள்ளியிடவும்.

(iv) A ஐயும் B ஐயும் வேறுபடுத்தி இனங்காண்பதற்குரிய ஒரு சோதனையை / தாக்கத்தை விவரிக்க.

B தருவது



தொலனின் சோதனைப்பொருள்	- வெள்ளி ஆடி
பீலிங்கின் கரைசல்	- சிவப்பு நிறம்
அமில் $K_2Cr_2O_7$	- பச்சை நிறம்
அமில் $KMnO_4$	- நிறமற்றது
(ஏதாவது ஒன்று)	

(5)


குறிப்பு: A யும் B யும் சரியாயின் மாத்திரமே புள்ளிகள் வழங்குக.

4 (a): 50 புள்ளிகள்


(b) (i) பின்வரும் தாக்கத் தொடரிகளில் J, K, L, M ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளைத் தருக.





J



K



L



M

(05 x 4)

(ii) I, II, III ஆகிய தாக்கங்களில் நடைபெறும் தாக்கத்தின் வகையைப் பின்வரும் பட்டியலிலிருந்து தெரிந்தெடுத்து எழுதுக.


கருநாட்டக் கூட்டல், கருநாட்டப் பிரதியீடு,
இலத்திரன்நாட்டக் கூட்டல், இலத்திரன்நாட்டப் பிரதியீடு, நீக்கல்

தாக்கம் I	- இலத்திரன் நாட்டப் பிரதியீட்டுத் தாக்கம்
தாக்கம் II	- கருநாட்ட கூட்டற் தாக்கம்
தாக்கம் III	- இலத்திரன் நாட்ட கூட்டற் தாக்கம்

(05 x 3 = 15)


குறிப்பு: தாக்கங்கள் I, II, III சரியாயின் மாத்திரமே புள்ளிகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.

- (iii) அற்கீன்களுக்கும் HBr இற்குமிடையே உள்ள தாக்கத்தின் பொறிமுறை பற்றிய உமது அறிவைப் பயன்படுத்தித் தாக்கம் III இன் பொறிமுறையைத் தருக.



பின்வரும் தாக்கப்பொறிமுறையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்

(15 புள்ளிகள்)



(12 புள்ளிகள்)

4 (b) : 50 புள்ளிகள்

பகுதி B — கட்டுரை

இரண்டு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் **150** புள்ளிகள் வீதம் வழங்கப்படும்.

5. (a) ஓரமில் மென்மூல **B** (0.15 mol dm^{-3}) இற்கும் HCl (0.10 mol dm^{-3}) இற்குமிடையே உள்ள ஒரு நியமிப்பு கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளவாறு ஓர் உகந்த காட்டியைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்டது. HCl கரைசல் (25.00 cm^3) நியமிப்புக் குடுவையில் வைக்கப்பட்டு, ஓர் அளவியைப் பயன்படுத்தி மென்மூலம் **B**, சேர்க்கப்பட்டது. 25°C இல் மென்மூலத்தின் கூட்டப்பிரிகை மாறிலி K_b ஆனது $1.00 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$ ஆகும். எல்லாப் பரிசோதனைகளும் 25°C இல் செய்யப்பட்டன.

(i) மூலம் **B** ஐச் சேர்ப்பதற்கு முன்னர் நியமிப்புக் குடுவையில் உள்ள அமிலக் கரைசலின் pH பெறுமானத்தைக் கணிக்க.

HCl கரைசலின் pH.

$$\begin{aligned} \text{pH} &= -\log[\text{H}^+] \\ &= -\log(0.1) \\ &= 1.0 \end{aligned} \quad \begin{array}{l} (2) \\ (2+1) \end{array}$$

- (ii) **B** இன் கரைசலின் 10.00 cm^3 ஐச் சேர்த்த பின்னர் நியமிப்புக் குடுவையில் உள்ள கரைசலின் pH பெறுமானத்தைக் கணிக்க. நியமிப்புக் குடுவையில் உள்ள கரைசல் ஒரு தாங்கற் கரைசலாகச் செயற்படுமா? உமது விடையை விளக்குக.

கரைசல் **B** இன் 10.00 cm^3 சேர்க்கப்பட்ட பின்னர் pH.

$$\begin{aligned} [\text{H}^+] &= \frac{0.1 \text{ mol dm}^{-3} \times 25.00 \text{ cm}^3 - 0.15 \text{ mol dm}^{-3} \times 10.00 \text{ cm}^3}{35.00 \text{ cm}^3} \\ &= 0.028 \text{ mol dm}^{-3} \end{aligned} \quad (4+1)$$

$$\text{pH} = 1.5 \text{ (or } 1.6) \quad (4+1)$$

இல்லை / கரைசல் தாங்கற் கரைசலாக தொழிற்பட முடியாது. (3)

புரோத்தனேற்றப்பட்ட மூலம் (இணைஅமிலம்) மாத்திரமே காணப்படுகின்றது. (தாக்கமுறாத அல்லது புரோத்தனேற்றப்படாத மூலம் காணப்படவில்லை) (3)

(சேர்க்கப்பட்ட H^+ , OH^- ஐ பயன்படுத்தி தகுந்த விளக்கம் தரப்படன் முழு புள்ளியையும் வழங்குக)

- (iii) சமவலுப் புள்ளியை அடைவதற்குத் தேவையான மென்மூலக் கரைசலின் கனவளவைக் கணிக்க.

சமவலுப்புள்ளியை அடைவதற்கு தேவையான மூலத்தின் கனவளவு.

$$V = \frac{0.1 \text{ mol dm}^{-3} \times 25.00 \text{ cm}^3}{0.15 \text{ mol dm}^{-3}} \quad (4+1)$$

$= 16.66 \text{ cm}^3$ (16.67 cm^3 அல்லது ஒரு தசமதானத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட விடை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்) (4+1)

- (iv) சமவலுப் புள்ளியை அடைந்த பின்னர் மென்மூலத்தின் வேறொரு 10.00 cm^3 கனவளவு நியமிப்புக் குடுவையில் சேர்க்கப்பட்டது. நியமிப்புக் குடுவையில் உள்ள கரைசலின் pH பெறுமானத்தைக் கணிக்க.

சமவலுப்புள்ளியை அடைந்த பின்னர் 10.00 cm^3 மூலத்தை சேர்த்த பின்னர் pH பெறுமானம்.

மென் மூலமானது பின்வருமாறு கூட்டற்பிரிகை அடைகிறது,



(பௌதீக நிலைகள் குறிக்கப்படாவிடினும் புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

$$K_b = \frac{[\text{BH}^+(\text{aq})][\text{OH}^-(\text{aq})]}{[\text{B(aq)}]} \quad (4)$$

அல்லது

$$\text{pOH} = \text{p}K_b + \log \left(\frac{[\text{BH}^+(\text{aq})]}{[\text{B(aq)}]} \right)$$

கூட்டற்பிரிகையின் அளவை புறக்கணிக்கலாம், (2)

$$\begin{aligned} \text{மென் மூலத்தின் செறிவு } [\text{B(aq)}] &= \frac{0.15 \text{ mol dm}^{-3} \times 10.00 \text{ cm}^3}{(25.00 \text{ cm}^3 + 16.66 \text{ cm}^3 + 10.00 \text{ cm}^3)} \end{aligned} \quad (4+1)$$

$$\begin{aligned} \text{புரோத்தனேற்றப்பட்ட மென்மூலத்தின் செறிவு } [\text{BH}^+(\text{aq})] &= \frac{0.15 \text{ mol dm}^{-3} \times 16.66 \text{ cm}^3}{(25.00 \text{ cm}^3 + 16.66 \text{ cm}^3 + 10.00 \text{ cm}^3)} \end{aligned} \quad (4+1)$$

$$\text{pOH} = -\log(1 \times 10^{-5}) + \log \left(\frac{0.15 \text{ mol dm}^{-3} \times 16.66 \text{ cm}^3}{0.15 \text{ mol dm}^{-3} \times 10.00 \text{ cm}^3} \right) \quad (4+1)$$

$$\text{pOH} = 5.0 + 0.221 = 5.221$$

$$\text{pH} = 8.78 \text{ (or } 8.7 \text{ or } 8.9 \text{ or } 9) \quad (4+1)$$

(v) மேலே (iv) இற் கிடைத்த கரைசல் ஒரு தாங்கற் கரைசலாகச் செயற்படுமா? உமது விடையை விளக்குக.

ஆம், இது ஒரு தாங்கற்கரைசலாக தொழிற்படும்.


(3)

நியமிப்புக்குடுவையிலுள்ள கரைசலானது புரோத்தனேற்றப்பட்ட மூலத்தையும் தாக்கமுறாத மூலத்தையும் கொண்டுள்ளது.

(3)

(சேர்க்கப்பட்ட H^+ உம் OH^- உம் பயன்படுத்தி தகுந்த விளக்கம் தரப்பட்டால் முழு புள்ளியை வழங்குக)

(vi) சேர்க்கப்படும் மென்மூலக் கரைசலின் கனவளவுடன் நியமிப்புக் குடுவையில் உள்ள கலவையின் pH பெறுமானம் மாறும் விதத்தை (நியமிப்பு வளையி) ஒரு பரும்படிப் படத்திற் காட்டுக. அச்சுக்களைப் பெயரிடுக. y- அச்சு மீது pH ஐயும் x-அச்சு மீது சேர்க்கப்படும் மென்மூலக் கரைசலின் கனவளவையும் குறிக்க. சமவலுப் புள்ளியை அண்ணளவாகக் குறிக்க. [சமவலுப் புள்ளியில் pH பெறுமானத்தைக் கணித்தல் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை.]



pH=1 இற்கும் pH=9 இற்கும் இடையே வளையியை சரியான உருவத்தில் காட்டுதல்

(4)

சமவலுப்புள்ளிக்கான கனவளவு குறித்தல்

(2)

சமவலுப்புள்ளிக்கான pH இனைக் குறித்தல் (pH = 5 இற்கும் pH=7 இற்கும் இடையில்)

(2)

அச்சுக்களை பெயரிடல் (தகுந்த சந்தர்ப்பத்தில் தேவையான அலகுகளுடன்)

(1+1)

5(a): 75 புள்ளிகள்

(b) ஓர் இலட்சியக் கரைசலை உண்டாக்கும் C, D என்னும் ஆவிப்பறப்புள்ள திரவங்களைப் பயன்படுத்திப் பின்வரும் இரு பரிசோதனைகளும் ஒரு மாறா வெப்பநிலையில் செய்யப்பட்டன.

பரிசோதனை I : C, D ஆகிய திரவங்கள் ஒரு வெற்றிடமாக்கப்பட்ட விறைத்த பாத்திரத்தில் புகுத்தப்பட்டுச் சமநிலையை அடைய விடப்பட்டன. தொகுதி சமநிலையில் இருக்கும்போது திரவ அவத்தையில் (L_1) C, D ஆகியவற்றின் மூல் பின்னங்கள் முறையே 0.3 , 0.7 என அவதானிக்கப்பட்டன. பாத்திரத்தின் மொத்த அழுக்கம் 2.70×10^4 Pa ஆக இருந்தது.

பரிசோதனை II : C, D ஆகியவற்றின் வெவ்வேறு அளவுகளைப் பயன்படுத்தி இப்பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. சமநிலை ஏற்பட்ட பின்னர் திரவ அவத்தையில் (L_2) C, D ஆகியவற்றின் மூல் பின்னங்கள் முறையே 0.6 , 0.4 என அவதானிக்கப்பட்டன. பாத்திரத்தின் மொத்த அழுக்கம் 2.40×10^4 Pa ஆக இருந்தது.

(i) ஆவி அவத்தையில் C இன் பகுதியழுக்கம் (P_C), அதன் நிரம்பலாவி அழுக்கம் (P_C°), அதன் திரவ அவத்தையில் மூல் பின்னம் (X_C) ஆகியவற்றுக்கிடையே உள்ள தொடர்பை ஒரு சமன்பாட்டு வடிவத்தில் தருக.

இச்சமன்பாடு பௌதிக இரசாயனவியலில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு விதியை எடுத்துரைக்கின்றது. இவ்விதியின் பெயரை எழுதுக.

$$P_C = X_C P_C^\circ$$

(5)

இரவோல்றின் விதி

(4)

PAPERMASTER.LK

(ii) C, D ஆகியவற்றின் நிரம்பலாவி அழுக்கங்களைக் கணிக்க.

பரிசோதனை I

$$2.7 \times 10^4 \text{ Pa} = 0.3 P_C^0 + 0.7 P_D^0 \quad \text{---(1)} \quad (4+1)$$

பரிசோதனை II

$$2.4 \times 10^4 \text{ Pa} = 0.6 P_C^0 + 0.4 P_D^0 \quad \text{---(2)} \quad (4+1)$$

$$(1) \times 2 - (2)$$

$$P_D^0 = 3.0 \times 10^4 \text{ Pa} \quad (4+1)$$

$$P_C^0 = (2.4 \times 10^4 \text{ Pa} - 0.4 \times 3.0 \times 10^4 \text{ Pa}) / 0.6 \\ = 2.0 \times 10^4 \text{ Pa} \quad (4+1)$$

(iii) பரிசோதனை I இன் ஆவி அவத்தை (V_I) இல் C, D ஆகியவற்றின் மூல் பின்னங்களைக் கணிக்க.

வாயு அவத்தையில் மூல் பின்னம் (பரிசோதனை I, V_I)

$$X_{C,I}^g = \frac{0.3 \times 2.0 \times 10^4 \text{ Pa}}{2.7 \times 10^4 \text{ Pa}} \quad (1+1)$$

$$= 0.2 \text{ (or } 0.22 \text{ or } 2/9) \quad (1+1)$$

$$X_{D,I}^g = 1 - 0.2 \text{ (or } 0.22) \quad (1+1)$$

$$= 0.8 \text{ (or } 0.78 \text{ or } 7/9) \quad (1+1)$$

(iv) பரிசோதனை II இன் ஆவி அவத்தை (V_{II}) இல் C, D ஆகியவற்றின் மூல் பின்னங்களைக் கணிக்க.

வாயு அவத்தையில் மூல் பின்னம் (பரிசோதனை II, V_{II})

$$X_{C,II}^g = \frac{0.6 \times 2.0 \times 10^4 \text{ Pa}}{2.4 \times 10^4 \text{ Pa}} \quad (1+1)$$


$$= 0.5 \quad (1+1)$$

$$X_{D,II}^g = 1 - 0.5 \quad (1+1)$$

$$= 0.5 \quad (1+1)$$

(v) மாறா வெப்பநிலையில் வரையப்பட்ட ஓர் அழுக்க - அமைப்பு அவத்தை வரிப்படத்தில் மேற்குறித்த இரு பரிசோதனைகளினதும் திரவ, ஆவி அவத்தைகளின் (L_I , L_{II} , V_I , V_{II}) அமைப்புகளையும் உரிய அழுக்கங்களையும் காட்டுக.

அழுக்கம் (Pa)



L=திரவம், V= ஆவி

(C இன் மூல்பின்னம் அதிகரித்து செல்லும் திசையில் அச்சுக்கள் மாறிகுறிக்கப்பட்டிருப்பினும் அதற்கு ஏற்ப புள்ளி வழங்குக)

அச்சுக்களை குறித்தல் (பொருத்தமான இடங்களில்)	(2+2)
P^0_C , P^0_D குறித்தல்	(2+2)
கோடு & வளையி (சரியான அழுக்கங்களில் ஆரம்ப முடிவுகளுடன் வரைதல்)	(2+2)
சுமநிலையில் உள்ள ஒவ்வொரு பிரதேசத்தையும் இனம்கானல்	(2+2+2)
X_C இல் புள்ளி L_I இனை குறித்தல் $X_C = 0.3$	(2)
X_C இல் புள்ளி L_{II} இனை குறித்தல் $X_C = 0.6$	(2)
X_C இல் புள்ளி V_I இனை குறித்தல் $X_C = 0.2$	(2)
X_C இல் புள்ளி V_{II} இனை குறித்தல் $X_C = 0.5$	(2)
சமமான மட்டத்தில் புள்ளிகள் L_I , V_I ஐ குறித்தல்	(2)
சமமான மட்டத்தில் புள்ளிகள் L_{II} , V_{II} ஐ குறித்தல்	(2)

(வரைபு அவத்தைக்கான மொத்தப் புள்ளிகள் = 30, நிலைக்குத்து அச்சில் அழுக்கத்திற்கு பதிலாக வெப்பநிலை பாவிக்கப்பட்டிருப்பின் புள்ளிகள் வழங்க வேண்டாம்)

5 (b): 75 புள்ளிகள்

6. (a) ஒரு சேதனக் கரைப்பானும் (org-1) நீரும் (aq) ஒன்றோடொன்று கலக்காத அதே வேளை அவை ஓர் ஈரவத்தைத் தொகுதியை உண்டாக்குகின்றன. வெப்பநிலை T இல் org-1 இற்கும் நீருக்குமிடையே X இன்

$$\text{பரம்பலுக்கான பங்கீட்டுக் குணகம் } K_D = \frac{[X]_{\text{org-1}}}{[X]_{\text{aq}}} = 4.0 \text{ ஆகும்.}$$

org-1 இன் 100.00 cm^3 ஐயும் நீரின் 100.00 cm^3 ஐயும் கொண்ட ஒரு தொகுதியுடன் X இன் 0.50 mol சேர்க்கப்பட்டது. தொகுதி வெப்பநிலை T இல் சமநிலையை அடைய விடப்பட்டது.

(i) org-1 இல் X இன் செறிவைக் கணிக்க.

$$[X]_{\text{org-1}} \text{ ஐ கணித்தல்}$$

$$K_D = \frac{[X]_{\text{org-1}}}{[X]_{\text{aq}}} = 4.0$$

$V =$ கனவளவு, $x =$ நீர் அவத்தையில் மூல்அளவு

$$K_D = \frac{\frac{0.5 \text{ mol} - x}{\frac{V}{x}}}{\frac{V}{x}} = 4.0 \quad (4+1)$$

$$x = 0.1 \text{ mol} \quad (4+1)$$

$$[x]_{\text{org-1}} = \frac{0.4 \text{ mol}}{100 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = 4.0 \text{ mol dm}^{-3} \quad (4+1)$$

(ii) நீரில் X இன் செறிவைக் கணிக்க.

$$[x]_{\text{aq}} = \frac{0.1 \text{ mol}}{100 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} = 1.0 \text{ mol dm}^{-3} \quad (4+1)$$

6 (a): 20 புள்ளிகள்

(b) சேர்வை Y ஆனது நீர் அவத்தையில் மாத்திரம் கரையத்தக்கது. நீர் அவத்தையில் X உம் Y உம் தாக்கம் புரிந்து Z ஐ உண்டாக்குகின்றன. Y, Z ஆகியன இருத்தல் org-1 இற்கும் நீருக்குமிடையே X இன் பரம்பலைப் பாதிப்பதில்லை.

org-1 ஐயும் நீரையும் கொண்ட ஓர் ஈரவத்தைத் தொகுதித் தொடர் தயாரிக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் X இன் பல்வேறு அளவுகள் இந்த ஈரவத்தைத் தொகுதிகளில் பரம்பலடையச் செய்யப்பட்டு, தொகுதிகள் சமநிலையை அடைய விடப்பட்டன. இந்த ஈரவத்தைத் தொகுதிகளின் நீர் அவத்தையுடன் Y சேர்க்கப்பட்ட பின்னர் X இற்கும் Y இற்குமிடையே நீர் அவத்தையில் நடைபெறும் தாக்கத்தின் தொடக்க வீதம் அளக்கப்பட்டது. வெப்பநிலை T இல் நடைபெற்ற இப்பரிசோதனைகளின் பேறுகள் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

பரிசோதனை எண்	நீர்க் கனவளவு (cm ³)	org-1 இன் கனவளவு (cm ³)	சேர்த்த X இன் மொத்த அளவு (mol)	சேர்த்த Y இன் மொத்த அளவு (mol)	தாக்கத்தின் தொடக்க வீதம் (mol dm ⁻³ s ⁻¹)
1	100.00	100.00	0.05	0.02	2.00×10^{-6}
2	100.00	100.00	0.10	0.04	1.60×10^{-5}
3	50.00	50.00	0.25	0.02	4.00×10^{-4}

X, Y ஆகியன குறித்துத் தாக்க வரிசைகள் முறையே m, n ஆகும். வெப்பநிலை T இல் தாக்க வீத மாறிலி k ஆகும்.

(i) நீர் அவத்தையில் X, Y ஆகியவற்றின் செறிவுகள் முறையே $[X]_{aq}$, $[Y]_{aq}$ எனத் தரப்பட்டிருப்பின், தாக்கத்திற்கான வீதக் கோவையை $[X]_{aq}$, $[Y]_{aq}$ m, n, k ஆகியவற்றின் சார்பில் எழுதுக.

$$\text{வீதம்} = k [X]_{aq}^m [Y]_{aq}^n \quad (10)$$

(ii) ஒவ்வொரு பரிசோதனையிலும் நீர் அவத்தையில் X இன் தொடக்கச் செறிவைக் கணிக்க.

(ii) நீர்ப்படையில் X இன் மூல் அளவு x , சேர்க்கப்பட்ட X இன் மொத்த மூல் அளவு n_x எனக் எல்லா பரிசோதனையிலும் org-1, நீர் என்பவற்றின் கனவளவுகள் சமமாகும்

$$[X]_{aq} = \frac{n_x}{5 \times V_{aq}}$$

பரிசோதனை	$[X]_{aq}/\text{mol dm}^{-3}$	
1	0.1	(4)
2	0.2	(4)
3	1.0	(4)

(iii) ஒவ்வொரு பரிசோதனையிலும் நீர் அவத்தையில் Y இன் தொடக்கச் செறிவைக் கணிக்க.

$[Y]_{aq}$ ஐ கணித்தல் சேர்க்கப்பட்ட Y இன் மொத்த மூல் அளவு n_y என்க. Y ஆனது நீர்ப்படையில் மட்டும் கரையும்.

$$[Y]_{aq} = \frac{n_y}{V_{aq}}$$

பரிசோதனை	$[X]_{aq}/\text{mol dm}^{-3}$	
1	0.2	(4)
2	0.4	(4)
3	0.4	(4)

(iv) X, Y ஆகியன குறித்து முறையே தாக்க வரிசைகள் m, n ஆகியவற்றைக் கணிக்க.

தாக்க வரிசைகளை கணித்தல்.

$$2.00 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^m (0.2 \text{ mol dm}^{-3})^n \quad \text{---(1)} \quad (10+2)$$

$$1.60 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k (0.2 \text{ mol dm}^{-3})^m (0.4 \text{ mol dm}^{-3})^n \quad \text{---(2)} \quad (10+2)$$

$$4.00 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k (1.0 \text{ mol dm}^{-3})^m (0.4 \text{ mol dm}^{-3})^n \quad \text{---(3)} \quad (10+2)$$

வரிசை m ஐ துணிதல்

(2)/(3) இல் இருந்து

$$\frac{1.60 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}}{4.00 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}} = \frac{k (0.2 \text{ mol dm}^{-3})^m (0.4 \text{ mol dm}^{-3})^n}{k (1.0 \text{ mol dm}^{-3})^m (0.4 \text{ mol dm}^{-3})^n} \quad (5)$$

$$0.04 = (0.2)^m$$

$$m = 2 \quad (4+1)$$

வரிசை n ஐ துணிதல்

(3)/(1) இல் இருந்து

$$\frac{4.00 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}}{2.00 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}} = \frac{k (1.0 \text{ mol dm}^{-3})^m (0.4 \text{ mol dm}^{-3})^n}{k (0.1 \text{ mol dm}^{-3})^m (0.2 \text{ mol dm}^{-3})^n} \quad (5)$$

$$200 = 10^2 (2)^n$$

$$n = 1 \quad (4+1)$$

(v) தாக்கத்தின் வீத மாறிலியைக் கணிக்க.

(v) தாக்க வரிசை மாறிலி

(1) இல் இருந்து

$$k = \frac{2.00 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}}{(0.1 \text{ mol dm}^{-3})^2 (0.2 \text{ mol dm}^{-3})^1} \quad (4+1)$$

$$= 1.0 \times 10^{-3} \text{ mol}^{-2} \text{ dm}^6 \text{ s}^{-1} \quad (4+1)$$

(vi) மேலே தரப்பட்ட பங்கீட்டுக் குணகத்தைப் பயன்படுத்தித் தாக்க வீதத்தின் மீது வெப்பநிலையின் விளைவைப் பரிசீலிப்பதற்காக ஒரு பரிசோதனை திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

தாக்க வீதத்தின் மீது வெப்பநிலையின் விளைவைப் பரிசீலிப்பதற்கு இது ஓர் உகந்த பரிசோதனையா? உமது விடையை விளக்குக.

பொருத்தமற்றது

(2)

பங்கீட்டுக் குணகம் வெப்பநிலையில் தங்கியுள்ளது

(3)

6(b): 105 புள்ளிகள்

(c) சேதனக் கரைப்பான் org-2 உம் நீரும் ஒன்றோடொன்று கலக்காத அதே வேளை ஓர் ஈரவத்தைத் தொகுதியை உண்டாக்குகின்றன. org-2 இன் 100.00 cm^3 உம் நீரின் 100.00 cm^3 உம் அடங்கும் ஒரு தொகுதியுடன் X (0.20 mol) சேர்க்கப்பட்டு வெப்பநிலை T இல் சமநிலையை அடைய விடப்பட்டது. அதன் பின்னர் Y (0.01 mol) ஆனது நீர் அவத்தையுடன் சேர்க்கப்பட்டு, தாக்கத்தின் தொடக்க வீதம் அளக்கப்பட்டது. org-2 இல் Y கரைவதில்லை. X இற்கும் Y இற்குமிடையே நீர் அவத்தையில் நடைபெறும் தாக்கத்தின் தொடக்க வீதம் $6.40 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$ எனக் காணப்பட்டது.

org-2 இற்கும் நீருக்குமிடையே X இன் பரம்பலுக்கான பங்கீட்டுக் குணகம் $\frac{[X]_{\text{org-2}}}{[X]_{\text{aq}}}$ ஐக் கணிக்க.

$[X]_{\text{org-2}}$ ஆனது org-2 அவத்தையில் X இன் செறிவாகும்.

தாக்கவீத மாறிலி மாறாது தாக்கம் நீர்ப்படையில் நடைபெறுகின்றது.

$$\text{வீதம்} = k [X]_{\text{aq}}^2 [Y]_{\text{aq}}$$

$$6.40 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}^{-2} \text{ dm}^6 \text{ s}^{-1} [X]_{\text{aq}}^2 \cdot 0.1 \text{ mol dm}^{-3} \quad (5)$$

$$[X]_{\text{aq}}^2 = 6.4 \times 10^{-3} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6} = 64 \times 10^{-4} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

$$[X]_{\text{aq}} = 8.0 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3} \quad (4+1)$$

$$K_D = \frac{[X]_{\text{org-2}}}{[X]_{\text{aq}}} = \frac{\left(\frac{0.2 \text{ mol}}{0.1 \text{ dm}^{-3}} - 0.08 \text{ mol dm}^{-3}\right)}{0.09 \text{ mol dm}^{-3}} \quad (4+1)$$

$$K_D = 24$$

(4+1)

6(c): 25 புள்ளிகள்

மாற்று விடை (c)

$$K_D = \frac{\left(\frac{0.2 \text{ mol} - x}{0.1 \text{ dm}^{-3}}\right)}{\left(\frac{x}{0.1 \text{ dm}^{-3}}\right)} \quad (4+1)$$

$$x = \frac{0.2 \text{ mol}}{K_D + 1}$$

$$[X]_{aq} = \frac{\frac{0.2 \text{ mol}}{(K_D + 1)}}{0.1 \text{ dm}^{-3}} = \frac{2}{(K_D + 1)} \text{ mol dm}^{-3} \quad (4+1)$$


$$\text{Rate} = k [X]_{aq}^m [Y]_{aq}^n$$

$$6.4 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = 1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} \left(\frac{2 \text{ mol dm}^{-3}}{(K_D + 1)}\right)^2 (0.1 \text{ mol dm}^{-3}) \quad (4+1)$$

$$64 \times 10^{-4} = \left(\frac{2}{K_D + 1}\right)^2 \quad (4+1)$$

$$K_D = 24 \quad (4+1)$$

7. (a) உலோகம் **M** இன் சார் அணுத் திணிவைக் காண்பதற்கு உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள ஒழுங்கமைப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. ஒரு மாறா ஓட்டத்தைப் பயன்படுத்தி 10 நிமிடத்திற்கு மின்பகுப்புச் செய்யப்பட்டது. இந்நேர வீச்சில் கலம் **A** இன் கதோட்டின் திணிவு 31.75 mg இனால் அதிகரித்திருக்கும் அதே வேளை கலம் **B** இன் கதோட்டின் திணிவு 147.60 mg இனால் அதிகரித்திருந்தது. (கலங்கள் **A** இலும் **B** இலும் நீரின் மின்பகுப்பு நடைபெறுவதில்லை எனக் கொள்க.)



(i) **A, B** ஆகிய கலங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் அனோட்டையும் கதோட்டையும் (①, ②, ③, ④ ஆகிய எண்களின் சார்பில்) இனங்காண்க.

(i) கலம் A

அனோட் = 1

(4)

கதோட் = 2

(4)

கலம் B

அனோட் = 3

(4)

கதோட் = 4

(4)

(ii) ஒவ்வொரு கலத்திலும் ஒவ்வொரு மின்வாயிலும் நடைபெறும் அரைத் தாக்கத்தை எழுதுக.

மின்வாய்த் தாக்கங்கள் Electrode reactions

கலம் A மின்வாய் 1 $\text{Cu(s)} \rightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$

(5)

கலம் A மின்வாய் 2 $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu(s)}$

(5)

கலம் B மின்வாய் 3 $\text{M(s)} \rightarrow \text{M}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^-$

(5)

கலம் B மின்வாய் 4 $\text{M}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{e}^- \rightarrow \text{M(s)}$

(5)

(பௌதீக நிலைகள் குறித்தல் அவசியம்)

(iii) மின்பகுப்பில் பயன்படுத்தப்பட்ட மாறா ஓட்டத்தைக் கணிக்க.

கரைந்த Cu(s) இன் அளவு = $31.75 \times 10^{-3} \text{ g}$

$$\text{தேவைப்பட்ட மின்கணியம்} = \frac{2 \times 96500 \text{ C mol}^{-1} \times 31.75 \times 10^{-3} \text{ g}}{63.5 \text{ g mol}^{-1}} = i \times 10 \times 60 \text{ s}$$

(2+1)+(2+1)+(2+1)+(2+1)

சரியான பீசமானம் (5)

மின்பகுப்பிற்கு பயன்பட்ட மின்னோட்டம் = $i = 0.16 \text{ A}$

(4+1)

(iv) உலோகம் **M** இன் சார் அணுத் திணிவைக் கணிக்க.

$M(s)$ படிவதால் கலம் B யின் மின்வாய் 4 இல் ஏற்பட்ட திணிவு அதிகரிப்பு = $147.6 \times 10^{-3} \text{ g}$

வீழ்ப்படியாகிய M இன் அளவு = $147.6 \times 10^{-3} \text{ g/W}$

இங்கு $W = M$ இன் மூலர்திணிவு

தேவைப்பட்ட மின்கனியம் = $\frac{3 \times 96500 \text{ C mol}^{-1} \times 147.6 \times 10^{-3} \text{ g}}{W} = 0.16 \text{ A} \times 600 \text{ s}$

W

(2+1)+(2+1)+(2+1)

சரியான பீசமானம்

(5)


$W = 445.1 \text{ g mol}^{-1}$

(2+1)

குறிப்பு: Cu இன் அணுத்திணிவுக்கு பதிலாக யாதாயினும் குறியீடு அல்லது பெறுமானம் பயன்படுத்தி விடை பெறப்பட்டிருப்பின் முழுப்புள்ளியும் வழங்குக.

7(a): 75 புள்ளிகள்

(b) (i) **A, B, C** ஆகியன இணைப்புச் சேர்வைகளாகும். அவற்றுக்கு ஓர் எண்முகக் கேத்திர கணிதம் உண்டு. ஒவ்வொரு சேர்வையிலும் இணையிகளின் இரண்டு வகைகள் உலோக அயனிடன் இணைந்துள்ளன. சேர்வைகளின் மூலக்கூற்றுச் சூத்திரங்கள் (வரிசையிலன்றி):



சேர்வைகளின் நீர்க் கரைசல்கள் $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2(\text{aq})$ உடன் பரிகரிக்கப்பட்டபோது கிடைத்த அவதானிப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

சேர்வை	$\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2(\text{aq})$
A	வெந்நீரில் கரையும் ஒரு வெண்ணிற வீழ்ப்படிவு
B	வீழ்ப்படிவு இல்லை
C	வெந்நீரில் கரையும் ஒரு மஞ்சள் நிற வீழ்ப்படிவு

I. **A, B, C** ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளைத் தருக.

I. **A, B, C** ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளைத் தருக.

A: $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_3(\text{H}_2\text{O})_3]\text{Cl}_2$ அல்லது $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_3(\text{NH}_3)_3]\text{Cl}_2$ (06)

B: $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]$ அல்லது $[\text{NiCl}_2(\text{NH}_3)_4]$ (06)

C: $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]\text{I}_2$ அல்லது $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{NH}_3)_4]\text{I}_2$ (06)

குறிப்பு: H_2O இற்கு பதிலாக OH_2 பாவிக்கலாம்.

II. $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2(\text{aq})$ உடன் சேர்வைகள் பரிகரிக்கப்பட்டபோது கிடைத்த வீழ்ப்படிவுகளின் இரசாயனச் சூத்திரங்களை எழுதுக.

(குறிப்பு : சேர்வையையும் சோதனைப் பொருளையும் குறிப்பிடுக.)

A $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ உடன் $\text{PbCl}_2 \downarrow$ (03)

C with $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ உடன் $\text{PbI}_2 \downarrow$ (03)

III. மேலே தரப்பட்ட சேர்வைகளில் உலோக அயனிடன் இணையாத அனயன்/அனயன்கள் இருந்தால், அந்த அனயன்கள் ஒவ்வொன்றையும் இனங்காண்பதற்கான இரசாயனச் சோதனை வீதம் அவதானிப்புடன் குறிப்பிடுக.

(குறிப்பு : நீர் தரும் சோதனைகள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு சோதனையாக இருத்தலாகாது.)

அன்னயன்கள் Cl^- , I^-

Cl^- AgNO_3 . கரைசலைச் சேர்க்க (03)

ஒரு வெண்ணிற வீழ்படிவு தோன்றும். இவ் வீழ்படிவானது ஐதான NH_4OH இல் கரையும். (03)

I^- AgNO_3 . கரைசலைச் சேர்க்க (03)


ஒரு மஞ்சள்நிற வீழ்படிவு தோன்றும். இவ் வீழ்படிவானது செறிந்த NH_4OH இல் கரையாது. (03)

அல்லது

சில துளி CHCl_3 சேர்க்கப்பட்டு பின் சிறிதளவு Cl_2 நீர் சேர்த்து குலுக்க. (03)

CHCl_3 படையானது ஊதாநிறமாக மாறும் (03)

(ii) ஒரு தாண்டல் உலோகம் **M** ஆனது நீர் ஊடகத்தில் ஒரு நிறச் சிக்கலயன் **P** ஐ உண்டாக்குகின்றது. அதற்குப் பொதுச் சூத்திரம் $[\text{M}(\text{H}_2\text{O})_n]^{m+}$ உண்டு. அது கீழே தரப்பட்டுள்ள தாக்கங்களுக்கு உட்படுகின்றது.



I. உலோகம் **M** ஐ இனங்காண்க. சிக்கலயன் **P** இல் உள்ள **M** இன் ஒட்சியேற்ற நிலையைத் தருக. (06 + 03)

$\text{Ni}, \quad +2$

II. சிக்கலயன் **P** இல் உள்ள **M** இன் இலத்திரன் நிலையமைப்பைத் தருக.



III. n , m ஆகியவற்றின் பெறுமானங்களைத் தருக.

$n = 6 \quad m = +2$ (03 + 03)

IV. **P** இன் கேத்திர கணிதத்தைத் தருக.

எண்முகி (03)

V. **Q**, **R**, **S** ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளைத் தருக.

Q: $\text{Ni}(\text{OH})_2$ (03)

R: $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ (03)

S: $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ (03)

VI. P, R, S ஆகிய சிக்கலயன்களின் IUPAC பெயர்களைத் தருக.

P: hexaaquanickel(II) ion (03)

R: tetrachloridonickelate(II) ion (03)


S: hexaamminenickel(II) ion (03)

7(b): 75 புள்ளிகள்


பகுதி C – கட்டுரை

(இரண்டு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. (ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் 150 புள்ளிகள் வீதம் வழங்கப்படும்))

8. (a) ஒரே சேதன ஆரம்பிக்கும் பொருளாக $C_6H_5CO_2CH_3$ ஐயும் பட்டியலில் தரப்பட்டுள்ளவற்றை மாத்திரம் சோதனைப் பொருள்களாகவும் பயன்படுத்தி, ஏழு (7) இற்கு மேற்படாத படிமுறைகளில் பின்வரும் சேர்வையை எங்ஙனம் தொகுப்பீரெனக் காட்டுக.




சோதனைப் பொருள்களின் பட்டியல்
 PCl_3 , Mg/உலர் ஈதர், H^+/H_2O , $LiAlH_4$, செறிந்த H_2SO_4




60 புள்ளிகள்

மாற்று முறை 1






60 புள்ளிகள்

மாற்று முறை 2




60 புள்ளிகள்

(b) பின்வரும் மாற்றல்கள் ஒவ்வொன்றையும் **மூன்றுக்கு (3) மேற்படாத** படிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி எங்ஙனம் நிறைவேற்றுவீர் எனக் காட்டுக.




மாற்று முறை ((b)(i))

(30 புள்ளிகள்)




(30 புள்ளிகள்)



(30 புள்ளிகள்)

மாற்று முறை (8(b)(ii))




(30 புள்ளிகள்)

8(b): 60 புள்ளிகள்

$$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-}$$

- விளைவுகள் $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-OC}_2\text{H}_5$ * $\text{CH}_3\text{CH=CH}_2$ (05 + 05)



8 (c): 30 புள்ளிகள்

9. (a) கரைசல் X இல் நான்கு உலோகக் கற்றயன்கள் அடங்கியுள்ளன. இக்கற்றயன்களை இனங்காண்பதற்குப் பின்வரும் சோதனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

	சோதனை	அவதானிப்பு
①	X இன் ஒரு சிறிய பகுதியுடன் ஐதான HCl சேர்க்கப்பட்டது.	வீழ்படிவு இல்லை
②	மேலே ① இல் கிடைக்கும் கரைசலினுடாக H_2S குமிழிகளாக செல்ல விடப்பட்டது.	ஒரு கருமை நிற வீழ்படிவு (P_1)
③	P_1 வடிகட்டி வேறாக்கப்பட்டது. H_2S ஐ நீக்குவதற்காக வடிதிரவம் கொதிக்க வைக்கப்பட்டு, குளிர்ச்சியாக்கப்பட்டு, NH_4Cl / NH_4OH சேர்க்கப்பட்டது.	ஒரு பச்சை நிற வீழ்படிவு (P_2)
④	P_2 வடிகட்டி வேறாக்கப்பட்டு, வடிதிரவத்தினுடாக H_2S குமிழிகளாகச் செல்ல விடப்பட்டது.	ஒரு வெண்ணிற வீழ்படிவு (P_3)
⑤	P_3 வடிகட்டி வேறாக்கப்பட்டது H_2S ஐ நீக்குவதற்காக வடிதிரவம் கொதிக்க வைக்கப்பட்டு, குளிர்ச்சியாக்கப்பட்டு $(NH_4)_2CO_3$ சேர்க்கப்பட்டது.	ஒரு வெண்ணிற வீழ்படிவு (P_4)

P_1 , P_2 , P_3 , P_4 ஆகிய வீழ்படிவுகளுக்குப் பின்வரும் சோதனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

வீழ்படிவு	சோதனை	அவதானிப்பு
P_1	P_1 ஆனது வெப்பமான ஐதான HNO_3 இல் கரைக்கப்பட்டு, செறிந்த NH_4OH மிகையாகச் சேர்க்கப்பட்டது.	ஒரு கரும் நீல நிறமுள்ள கரைசல் (கரைசல் 1)
P_2	* P_2 உடன் ஐதான NaOH மிகையாகச் சேர்க்கப்பட்டு பின்னர் H_2O_2 சேர்க்கப்பட்டது. * கரைசல் 2 உடன் ஐதான H_2SO_4 சேர்க்கப்பட்டது.	ஒரு மஞ்சள் நிறமுள்ள கரைசல் (கரைசல் 2) ஒரு செம்மஞ்சள் நிறமுள்ள கரைசல் (கரைசல் 3)
P_3	* P_3 ஆனது ஐதான HCl இற் கரைக்கப்பட்டு, ஐதான NaOH படிப்படியாகச் சேர்க்கப்பட்டது. * ஐதான NaOH ஐச் சேர்த்தல் தொடர்ந்து நடைபெற்றது	ஒரு வெண்ணிற வீழ்படிவு (P_5) P_5 கரைந்து ஒரு நிறமற்ற கரைசலைத் தந்தது. (கரைசல் 4)
P_4	P_4 ஆனது செறிந்த HCl இல் கரைக்கப்பட்டு, சுவாலைச் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது.	ஒரு செங்கட்டிச் சிவப்புச் சுவாலை

- (i) கரைசல் X இல் உள்ள நான்கு உலோகக் கற்றயன்களை இனங்காண்க. (காரணங்கள் அவசியமல்ல.)



(05 x 4 = 20)

- (ii) P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 ஆகிய வீழ்படிவுகளையும் 1, 2, 3, 4 ஆகிய கரைசல்களின் நிறங்களுக்குக் காரணமான இரசாயன இனங்களையும் இனங்காண்க.

(குறிப்பு : இரசாயனச் சூத்திரங்களை மாத்திரம் எழுதுக.)

I	P_1 :	CuS
	P_2 :	Cr(OH) ₃
	P_3 :	ZnS
	P_4 :	CaCO ₃
	P_5 :	Zn(OH) ₂

(06 x 5 = 30)

II	கரைசல் 1:	[Cu(NH ₃) ₄] ²⁺	(07)
	கரைசல் 2:	Na ₂ CrO ₄ அல்லது CrO ₄ ²⁻	(06)
	கரைசல் 3:	Na ₂ Cr ₂ O ₇ அல்லது Cr ₂ O ₇ ²⁻	(06)
	கரைசல் 4:	Na ₂ ZnO ₂ அல்லது ZnO ₂ ²⁻	(06)
		Na ₂ Zn(OH) ₄ அல்லது [Zn(OH) ₄] ²⁻	

9(a): 75 புள்ளிகள்

- (b) நீர் மாதிரி Y இல் SO_3^{2-} , SO_4^{2-} , NO_3^- என்னும் அனயன்கள் அடங்கியுள்ளன. நீர் மாதிரியில் அடங்கும் அனயன்களை அளவறிமுறையாகப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்குப் பின்வரும் நடைமுறைகள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

நடைமுறை 1

மாதிரி Y இன் 25.00 cm³ உடன் மிகையான ஓர் ஐதான BaCl₂ கரைசல் கலக்கிக் கொண்டு சேர்க்கப்பட்டது. அதன்பின்னர் உண்டாகிய வீழ்படிவுடன் கார மணமுள்ள ஒரு வாயு மேலும் வெளிவிடப்படாமல் இருக்கும் வரைக்கும் கலக்கிக் கொண்டு ஐதான HCl மிகையாகச் சேர்க்கப்பட்டது. கரைசல் 10 நிமிடங்களுக்கு விடப்பட்டு வடிகட்டப்பட்டது. வீழ்படிவு காய்ச்சி வடித்த நீரினால் கழுவப்பட்டு, ஒரு மாறாத திணிவு கிடைக்கும் வரைக்கும் 105 °C இல் ஒரு கனலடுப்பில் உலர்த்தப்பட்டது. வீழ்படிவின் திணிவு 0.174 g ஆக இருந்தது. கிடைத்த வடிதிரவம் மேலதிக பகுப்பாய்வுக்காக வைக்கப்பட்டது. (நடைமுறை 3 ஐப் பார்க்க.)

நடைமுறை 2


மாதிரி Y இன் 25.00 cm³ உடன் மிகையாக ஐதான H₂SO₄ உம் அமிலமாக்கிய 5% KIO₃ கரைசல்களும் சேர்க்கப்பட்டன. மாப்பொருளைக் காட்டியாகப் பயன்படுத்தி, ஒரு 0.020 mol dm⁻³ Na₂S₂O₃ கரைசலுடன் விடுவிக்கப்படும் I₂ ஆனது உடனடியாக நியமிப்புச் செய்யப்பட்டது. பயன்படுத்திய Na₂S₂O₃ இன் கனவளவு 20.00 cm³ ஆக இருந்தது. (இந்நடைமுறையில் SO_3^{2-} அயன்கள் வளிமண்டலத்திற்கு வெளியேறாமல் சல்பேற்று அயன்கள் (SO_4^{2-}) ஆக ஒட்சியேற்றப்படுகின்றன எனக் கொள்க.)

நடைமுறை 3

நடைமுறை 1 இற் கிடைத்த வடிதிரவத்தை ஐதான NaOH உடன் நடுநிலையாக்கி, அதனுடன் மிகையாக Al தூளும் ஐதான NaOH உம் சேர்க்கப்பட்டன. கரைசல் வெப்பமாக்கப்பட்டு, விடுவிக்கப்பட்ட வாயு ஒரு 0.11 mol dm⁻³ HCl கரைசலின் ஓர் 20.00 cm³ கனவளவிற்கு அளவறிமுறையாக அனுப்பப்பட்டுத் தாக்கம்புரியச் செய்யப்பட்டது. தாக்கம் பூரணமடைந்தமை பாசிச்சாயத்துடன் சோதிக்கப்பட்டது. வெளிவிடப்பட்ட வாயுவுடன் தாக்கம் புரிந்த பின்னர் எஞ்சியிருக்கும் HCl ஒரு 0.10 mol dm⁻³ NaOH கரைசலுடன் மெதையிற் செம்மஞ்சளைக் காட்டியாகப் பயன்படுத்தி, நியமிப்புச் செய்யப்பட்டது. தேவைப்பட்ட NaOH இன் கனவளவு 10.00 cm³ ஆக இருந்தது.




- (i) **நடைமுறைகள் 1, 2, 3** ஆகியவற்றில் நடைபெறும் தாக்கங்களுக்கான சமன்படுத்திய அயன்/அயனல்லாத சமன்பாடுகளை எழுதுக.

செய்முறை 1





BaSO_4 ஆனது கரையாது எஞ்சியிருக்கும்

செய்முறை 2




அல்லது



ஆகவே, $5\text{SO}_3^{2-} \equiv 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ **அல்லது** $5\text{SO}_2 \equiv 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ & $\text{SO}_2 \equiv \text{SO}_3^{2-}$

செய்முறை 3



- (ii) நீர் மாதிரி Y இல் SO_3^{2-} , SO_4^{2-} , NO_3^- ஆகியவற்றின் செறிவுகளைத் (mol dm^{-3}) துணிக.
(Ba = 137; S = 32; O = 16)

செய்முறை I – SO_4^{2-} இன் செறிவைத் துணிக

$$\text{BaSO}_4 \text{ இன் மூலர்திணிவு} = 137 + 32 + 64 = 233 \quad (02)$$

$$\text{வீழ்ப்படிவாகிய BaSO}_4 \text{ இன் திணிவு} = 0.174 \text{ g}$$

$$\text{ஆகவே, BaSO}_4 \text{ இன் மூல் அளவு} = \frac{0.174}{233} \quad (02)$$

$$\text{ஆகவே, SO}_4^{2-} \text{ இன் மூல் அளவு} = \frac{0.174}{233} = 7.47 \times 10^{-4} \quad (02)$$

$$\text{SO}_4^{2-} \text{ இன் செறிவு} = \frac{7.47 \times 10^{-4}}{25} \times 1000 \quad (02)$$

$$= 0.029 \text{ (0.03) mol dm}^{-3} \quad (03 + 01)$$

செய்முறை 2 – SO_3^{2-} இன் செறிவைத் துணிதல்

$$\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \text{ இன் மூல் அளவு} = \frac{0.02}{1000} \times 20 \quad (02)$$

$$\text{ஆகவே, } \text{SO}_3^{2-} \text{ இன் மூல் அளவு} = \frac{0.02}{1000} \times 20 \times \frac{5}{2} \quad (02)$$

$$\begin{aligned} \text{SO}_3^{2-} \text{ இன் செறிவு} &= \frac{0.02}{1000} \times 20 \times \frac{5}{2} \times \frac{1000}{25} \quad (02) \\ &= \mathbf{0.04 \text{ mol dm}^{-3}} \quad (03 + 01) \end{aligned}$$

செய்முறை 3 – NO_3^- இன் செறிவைத் துணிதல்

$$\text{HCl} \text{ இன் மூல் அளவு} = \frac{0.11}{1000} \times 20 \quad (02)$$

$$\text{NaOH} \text{ இன் மூல் அளவு} = \frac{0.10}{1000} \times 10 \quad (02)$$

$\text{NaOH} : \text{HCl}$ இன் பீசமானம் 1:1

$$\text{NH}_3 \text{ உடன் தாக்கிய HCl இன் மூல் அளவு} = \frac{0.11}{1000} \times 20 - \frac{0.10}{1000} \times 10 \quad (02)$$

$$= \frac{1}{1000} (2.2 - 1) = \frac{1.2}{1000} \quad (02)$$

$$\text{ஆகவே, } \text{NH}_3 \text{ இன் மூல் அளவு} = \frac{1.2}{1000} \quad (02)$$

$$\text{ஆகவே, } \text{NO}_3^- \text{ இன் மூல் அளவு} = \frac{1.2}{1000} \quad (02)$$

$$\begin{aligned} \text{NO}_3^- \text{ இன் செறிவு} &= \frac{1.2}{1000} \times \frac{1000}{25} \quad (02) \\ &= \mathbf{0.048 \text{ mol dm}^{-3}} \quad (03 + 01) \end{aligned}$$

(iii) நடைமுறைகள் 2, 3 ஆகியவற்றின் நியமிப்புகளில் அவதானிக்கத்தக்க நிற மாற்றத்தைத் தருக.


(குறிப்பு : பகுப்பாய்வுக்குத் தடையாக இருக்கத்தக்க வேறு அயன்கள் மாதிரி Y இல் இல்லையெனக் கொள்க.)

செய்முறை 2: நீலம் $\rightarrow$ நிறமற்றது (03)

செய்முறை 3: சிவப்பு $\rightarrow$ மஞ்சள் (03)

9 (b): 75 புள்ளிகள்

10. (a)



டௌஸ் செயன்முறையைப் (Dow process) பயன்படுத்தி மகனீசியம் (Mg) உலோகத்தை உற்பத்தி செய்தலை மேற்குறித்த பாய்ச்சற் கோட்டுப்படம் காட்டுகின்றது.

பாய்ச்சற் கோட்டுப்படத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக.

(i) ஆரம்பிக்கும் பொருள் A ஐ இனங்காண்க.

கடல் நீர்/ பிற்பேன் கரைசல்

(03)

(ii) B, C, D, E, F, G ஆகியவற்றிற் பயன்படுத்தப்படும் செயன்முறைகளைக் கீழே உள்ள பட்டியலிலிருந்து இனங்காண்க.

ஆவியாகல், கரைதல், வெப்பப் பிரிகை, மின்பகுப்பு, ஒரு சோதனைப் பொருளின் மீள்குழற்சி, வீழ்படிவாக்கம்.

B: பிரிகை அடைதல்

C: வீழ்படிவாதல்

D: கரைதல்

E: ஆவியாதல்

F: மின்பகுத்தல்

G: சோதனைப் பொருளை மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்தல்

(02 x 6 = 12)

(iii) B இற் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனச் சேர்வையை இனங்காண்க.

CaCO_3

(03)

(iv) **P, Q, R, T** ஆகிய இரசாயன இனங்களை இனங்காண்க.

P: Mg(OH)_2

Q: HCl

R: MgCl_2

T: Cl_2

(02 x 4 = 8)

(v) **B, C, D, F** ஆகியவற்றில் நடைபெறும் செயன்முறைகளுக்குச் சமன்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாடுகளை / அரைத் தாக்கங்களைத் தருக.

(குறிப்பு : அரைத் தாக்கங்களை எழுதுகையில் உரிய சந்தர்ப்பங்களில் அனோட்டையும் கதோட்டையும் இனங்காண்க.)

B: $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CaO} + \text{CO}_2$ (02)

C: $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Ca(OH)}_2$ (02)

$\text{Ca(OH)}_2 \longrightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^-$ (02)

$\text{Mg}^{2+} + 2\text{OH}^- \longrightarrow \text{Mg(OH)}_2$ (02)

அல்லது

$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^-$ (04)

$\text{Mg}^{2+} + 2\text{OH}^- \longrightarrow \text{Mg(OH)}_2$ (02)

அல்லது

$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} + \text{Mg}^{2+} \longrightarrow \text{Mg(OH)}_2 + \text{Ca}^{2+}$ (06)

D: $\text{Mg(OH)}_2 + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (02)

F: அனோட் – (C) $2\text{Cl}^- (\text{l}) \rightarrow \text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{e}$ (02 + 02)

கதோட் – (Fe) $\text{Mg}^{2+}(\text{l}) + 2\text{e} \rightarrow \text{Mg}(\text{l})$ (02 + 02)

குறிப்பு: அரைத்தாக்கங்களுக்கு பெளதீக நிலைகள் குறிக்கப்பட்டிருப்பின் மட்டும் புள்ளிகள் வழங்குக.

(vi) **G** இல் நடைபெறும் தாக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

மீள் சுழற்சிக்கு/ மீள் உற்பத்திக்கு உட்படுத்துதல். (03)

உற்பத்தி செலவு குறைகின்றது / வினைத்திறன் ஆனது. (03)

10 (a) : 50 புள்ளிகள்

(b) (i) கீழே தரப்பட்டுள்ள கைத்தொழில்களைக் கருதுக.

நிலக்கரி வலு நிலையங்கள்
குளிரேற்றலும் வளிச்சீராக்கமும்
போக்குவரத்து
விவசாயம்
விலங்கு வேளாண்மை

I. மேலே தரப்பட்டுள்ள எல்லா ஐந்து கைத்தொழில்களும் பூகோள வெப்பமாதலுக்குப் பங்களிப்புச் செய்கின்றன. பூகோள வெப்பமாதலுக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் இக்கைத்தொழில்கள் ஒவ்வொன்றுடனும் தொடர்புபட்ட வாயு நிலையிலுள்ள இரசாயன இனங்களை இனங்காண்க.

நிலக்கரி வலு நிலையங்கள் – CO_2

குளிர்ப்பதனமும் வளி சீராக்கமும் – CFC / HFC / HCFC

போக்குவரத்து – CO_2

விவசாயம் – N_2O

விலங்கு வேளாண்மை – CH_4

(03 x 5 = 15)

II. பூகோள வெப்பமாதல் காரணமாக ஏற்படத்தக்க மூன்று பாதகமான காலநிலை மாற்றங்களைக் குறிப்பிடுக.

- கடல் மட்டம் உயர்தல்
- புயல், சூறாவளி ஏற்படல்
- குறித்த பிரதேசத்தில் வெள்ளம்
- குறித்த பிரதேசத்தில் மழைவீழ்ச்சி குறைவடைதல் / வறட்சி
- கடல் நீர் ஆற்று நீருடன் கலத்தல்
- குறித்த பிரதேசத்தில் கடும் மழை ஏற்படல்

(ஏதாவது மூன்று)

(03 x 3 = 9)

(ii) மேலே (i) இல் தரப்பட்டுள்ள கைத்தொழில்களில்

I. ஒளியிரசாயனப் புகாருக்கு

போக்குவரத்து

II. அமில மழைக்கு

நிலக்கரி வலு நிலையமும் போக்குவரத்தும்

III. நற்போசனையாக்கத்திற்குப்

பங்களிப்புச் செய்யும் முக்கிய கைத்தொழிலை / கைத்தொழில்களை இனங்காண்க.

விவசாயமும் விலங்கு வேளாண்மையும்

(02 x 5 = 10)

(iii) இலங்கையில் மழைவீழ்ச்சி குறைவதன் விளைவாக நீர்மின்னைப் பிறப்பிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் நீர்த்தேக்கங்களின் நீரேந்து பிரதேசங்களுக்கு அண்மையில் செயற்கை மழையை உண்டாக்குதல் சோதிக்கப்பட்டது. இச்செயன்முறையில் நீராவியை ஒடுங்கச் செய்து முகில்கள் உண்டாதலைத் தூண்டுவதற்கு ஈரங்காட்டும் (hygroscopic) உப்புகளின் (NaCl, CaCl₂, NaBr) நுண் துணிக்கைகள் சிவிறப்படுகின்றன.

இவ்வுப்புகள் நீரேந்து பிரதேசங்களைச் சுற்றி உள்ள நீரினுள்ளே புகுவதன் விளைவாக நேரடியாகப்

I. பாதிக்கப்படும்

பாதிப்படையும் பரமானங்கள்

கடத்துதிறன்

(02)

- அயன்களின் செறிவு அதிகரிப்பதால் கடத்துதிறன் அதிகரிக்கும். (02)

II. பாதிக்கப்படாத

நீர்ப் பண்புச் சாராமாறிகளைப் பின்வரும் பட்டியலிலிருந்து தெரிந்தெடுக்க. உமது தெரிவுக்கான காரணங்களைச் சுருக்கமாகத் தருக.

நீரின் பண்புச் சாராமாறிகளின் பட்டியல்:

pH, கடத்துதிறன் கலங்கற்றன்மை, கரைந்த ஓட்சிசன்

பாதிப்படையாத பரமானங்கள்

pH, கலங்கல், கரைந்துள்ள ஓட்சிசன்

(02 + 02 + 02)

- இவ் உப்புக்கள் நீர்ப்பகுப்பிற்கு உட்படுவதில்லை எனவே pH இல் பாதிப்பு இல்லை.
- இவ் உப்புக்கள் நீரில் நன்கு கரையும் ஆதலால் கலங்கல் தன்மைக்கு பங்களிப்பு செய்வதில்லை.
- இவ் உப்புக்கள் O₂ உடன் தாக்கம் அடைவதில்லை.

(02 x 3 = 6)

10 (b): 50 புள்ளிகள்

(c) பின்வரும் வினாக்கள் உயிரிசல் உற்பத்தியை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

(i) உயிரிசல் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருள்களைக் குறிப்பிடுக.

தாவர எண்ணெய்கள், CH₃OH (மெதனோல்)

(05 + 05)

(ii) அம்மூலப்பொருள்கள் ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள முக்கிய இரசாயனச் சேர்வையைப் பொருத்தமான சந்தர்ப்பங்களிற் குறிப்பிடுக.

தாவர எண்ணெய்கள் – முகிலிசரைட்டுக்கள்

(05)

(iii) பாடசாலை இரசாயன ஆய்கூடத்தில் உயிரிசல் உற்பத்தியில் ஊக்கியாகப் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனச் சேர்வையைக் குறிப்பிடுக.

NaOH / KOH


PAPERMASTER.LK

(05)

(iv) மேலே (ii) இற் குறிப்பிட்ட இரசாயனச் சேர்வைகளைப் பயன்படுத்தி உயிர்மீசல் தொகுக்கப்படுவதைக் காட்டுவதற்கு ஒரு சமன்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாட்டைத் தருக.

NaOH / KOH

(05)



1. R ஆனது $\text{R}_1, \text{R}_2, \text{R}_3$ ஆக இருக்கலாம். சமன்பாடு இதற்கேற்ப சமப்படுத்தப் படுத்தப் பட்டிருக்க வேண்டும்.
2. சரியாக சமப்படுத்திய சமன்பாட்டிற்கு (20 புள்ளிகள்). சமன்பாடு சமப்படுத்தாவிடில் ஒவ்வொரு சரியான தாக்கிகள், விளைவுகளுக்கு 4 புள்ளிகள் வழங்குக.
3. இவ் வருடம் மாத்திரமே $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}, \text{ROH}$ என்பன ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

(v) ஊக்கி மிகையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டால், நடைபெறத்தக்க ஒரு பக்கத் தாக்கத்தை அதன் விளைபொருள்களுடன் இனங்காண்க.

சவர்க்கார உற்பத்தி தாக்கம் அல்லது இதன் விவரணம்.
உற்பத்தி - சவர்க்காரம் ($\text{R-COO}^-\text{Na}^+$)

(05)

(05)

10 (c) : 50 புள்ளிகள்