

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උ/පෙළ) විභාගය

13 ශ්‍රේණිය

රසායන විද්‍යාව

පිළිතුරු පත්‍රය

I කොටස

1 - (4) 2 - (5) 3 - (2) 4 - (4) 5 - (4) 6 - (2) 7 - (1) 8 - (2) 9 - (2) 10 - (4)
11 - (3) 12 - (2) 13 - (2) 14 - (4) 15 - (1) 16 - (2) 17 - (4) 18 - (4) 19 - (3) 20 - (3)
21 - (2) 22 - (2) 23 - (5) 24 - (3) 25 - (3) 26 - (3) 27 - (2) 28 - (1) 29 - (3) 30 - (1)
31 - (2) 32 - (5) 33 - (5) 34 - (1) 35 - (1) 36 - (1) 37 - (4) 38 - (2) 39 - (5) 40 - (3)
41 - (4) 42 - (4) 43 - (3) 44 - (2) 45 - (2) 46 - (5) 47 - (3) 48 - (1) 49 - (2) 50 - (2)

II කොටස


ව්‍යුහගත රචනා

(A කොටස)

01. (i) මෙහි මුල් අයනීකරණ ශක්ති හතර දල වශයෙන් ක්‍රමානුකූලව වැඩි වුව ද 4 වන අයනීකරණ ශක්තියට සාපේක්ෂව 5 වන අයනීකරණ ශක්තිය විශාල ලෙස වැඩි වී ඇත. එනම් 5 වන ඉලෙක්ට්‍රෝනය ඉතා ස්ථායී උච්ච වායු වින්‍යාසයක් ඇති අවස්ථාවකින් ඉවත් කරන බව පෙනේ. එනම් බාහිර ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 4 කි. $\therefore$ මූලද්‍රව්‍යයේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය $ns^2 np^2$ වර්ගයට අයත් ය. $\therefore$ D, 14 කාණ්ඩයට අයත් වේ.


(ii) B හා C පිළිවෙලින් ආවර්තිතා වගුවේ 2 හා 3 කාණ්ඩ වලට අයත් වේ. B හි ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය ns^2 වර්ගයට ද හි ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය $ns^2 np^1$ වර්ගයට ද අයත් වේ. ns^2 ආකාරය $ns^2 np^1$ ආකාරයට වඩා ස්ථායී ය. තව ද $ns^2 np^1$ ආකාරයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කළ විට සාපේක්ෂව වඩා ස්ථායී ns^2 වින්‍යාසය ලැබේ. එනිසා C බාහිර උප ශක්ති මට්ටමින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කිරීමට ලබා දිය යුතු ශක්තිය ලබාදිය යුතු ශක්තියට වඩා අඩු වේ. එනිසා C හි ප්‍රථම අයනීකරණ ශක්තිය C හි ප්‍රථම අයනීකරණ ශක්තියට වඩා අඩු වේ.

(iii)



ඉහත කරන මූලාංකය.

(iv)



පරමාණුක ක්‍රමාංකය.

(v) E හි සහසංයුජ අරය D හි සහසංයුජ අරයට වඩා අඩුය. එසේම E හි න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය D හි න්‍යෂ්ටික ආරෝපණයට වඩා වැඩිය. එනිසා බන්ධනයේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන තමා දෙසට ඇදගැනීමේ හැකියාව වඩා විශාලය.

(vi) Si

(vii) A



02. (i)

Na	S	H	O
$\frac{18.5}{23}$	$\frac{25.8}{32}$	$\frac{4.0}{1}$	$\frac{51.7}{16.0}$
1	:	1	:
		5	:
			4

$NaSH_5O_4$

(ii) ආනුභවික සූත්‍රයට අනුව ස්කන්ධය

= 124

 $\therefore$ අණුක සූත්‍රය

(iv) නයිපො හෝ සෝඩියම් තයෝසල්ෆේට්.

(v) ඡායාරූප කර්මාන්තයට / දිලීර නාශකයක් ලෙස / විශ්ලේෂණය සඳහා රසායනාගාර වල.

03. (c) (i)

(ii)

(iii)

(iv)


(b) (i) සංයෝග දෙකටම වෙන වෙනම ඇමෝනිය කියුප්‍රස් ක්ලෝරයිඩ් එක්කර සොලවන්න. එවිට දුඹුරු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබෙන්නේ දෙවැනි සංයෝගයෙන් පමණි.

නැතහොත්



සංයෝග දෙකටම වෙන වෙනම ඇමෝනිය සිල්වර් නයිට්‍රේට් එක්කර සොලවන්න. එවිට සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබෙන්නේ මෙවැන්නෙන් පමණි.

(ii) සංයෝග දෙක වෙන වෙනම ජලීය NaOH සමඟ රත් කරන්න. ලැබෙන ඵලයට $5 - 10^\circ\text{C}$ ත් අතර උෂ්ණත්වයක දී NaNO_2 හා තනුක HCl එක් කරන්න. එවිට ලැබෙන ඵලයට සිසිල් ඝෞර්ය ඊතෝල් ද්‍රාවණයක් එක් කරන්න. එවිට පළමු සංයෝගයෙන් ලත් ජලයෙන් පමණක් තැඹිලි පැහැ සායමක් ලැබේ.


04. (a) (i)

(ii) x = සාදු NH_3 y = LiAlH_4 හෝ $\text{Na/C}_2\text{H}_5\text{OH}$ හෝ රේනි Ni/H_2 (iii) Q හි α කාබන් පරමාණුව අසමමිතික වේ. $\therefore$ Q ප්‍රකාශ සමාවයවිකතාව දක්වයි.(iv) T සංයෝගයට $\text{NaNO}_2/\text{dil HCl}$ එක්කළ විට වායු බුබුලු (N_2 වායුව) පිටවේ.

(b)

රචනා (B කොටස)

හෝ



(b) $R \propto [\text{H}_2\text{O}_2]^n$

$$[\text{H}_2\text{O}_2]^n \propto V_{(\text{H}_2\text{O}_2 \text{ පරිමාව})}$$

$$\therefore R \propto V^n$$

නවද $R \propto 1/t$

$$\therefore 1/t \propto V^n$$


$$1/t = KV^n \text{ හෝ } tV^n = K$$

$$n = 1 \text{ නම්, } tV = K$$

දත්ත අනුව

$$n = 1 \text{ වේ.}$$

(c) මිශ්‍රණයේ සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා නම්,




ප්‍රතික්‍රියා $\textcircled{1}$ ප්‍රතික්‍රියා $\textcircled{2}$ ට වඩා සීඝ්‍රව සිදුවේ.

$\therefore$ $\textcircled{1}$ ප්‍රතික්‍රියාවේ පිටවන I_2 වායුව සීඝ්‍රව $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ මගින් I^- බවට පරිවර්ථනය වේ.

$\therefore$ ද්‍රාවණයෙහි තිබෙන තුරු පිෂ්ඨය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට නිදහස් I_2 නැත.

$\therefore$ කාලය යනුවෙන් $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$, I_2 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට යන කාලය ගනු ලැබේ.

(d) සමීකරණ $\textcircled{1}$ න් සහ $\textcircled{2}$ න්



$$\text{මාධ්‍යයෙහි } \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \text{ ප්‍රමාණය} = \frac{10 \times 0.005}{1000} = 5 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

$$\text{අයන සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කළ හැකි} = \frac{5}{2} \times 10^{-5} \text{ mol}$$


$$\text{මිශ්‍රණයෙහි ආරම්භයේ දී } \text{H}_2\text{O}_2 \text{ ප්‍රමාණය} = \frac{5}{2} \times 3 = 3 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\therefore 21\text{S දී ඉතිරිවන } \text{H}_2\text{O}_2 \text{ ප්‍රමාණය} = \frac{1}{10} \times 30 \times 10^{-5} - 2.5 \times 10^{-5} \\ = 27.5 \times 10^{-5}$$

$$\therefore \text{ඉතිරිව ඇති ප්‍රමාණය මුල් සාන්ද්‍රණයේ භාගයක් ලෙස} = \frac{27.5 \times 10^{-5}}{30 \times 10^{-5}} = \frac{11}{12}$$

(e) උෂ්ණත්වය වැඩි කළ විට, සක්‍රීයතා ශක්තියට පත්වන අණු සංඛ්‍යාව ද වැඩිවේ. අණු අතර ඇතිවන සංඝට්ටනය ද වැඩිවේ. මේ හේතුවෙන් දෙක නිසා $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ හා I_2 අතර ප්‍රතික්‍රියාව සීඝ්‍රතාවයෙන් සිදුවේ.

$$\begin{aligned} 06. \quad (a) \quad (i) \quad E^\circ_{\text{cell}} &= E^\circ_{\text{RHS}} - E^\circ_{\text{LHS}} \\ &= E^\circ_{\text{Cu}^{+2}/\text{Cu}} - E^\circ_{\text{Zn}^{+2}/\text{Zn}} \\ &= 0.34 - (-0.14) \text{ V} \\ &= 0.48 \text{ V} \end{aligned}$$





$$(iii) \quad E(M^{+2}/M) = E^\circ(M^{+2}/M) + 0.0295 \log_{10}[M^{+2(aq)}]$$


$$E(\text{Sn}^{+2}/\text{Sn}) = E^\circ(\text{Sn}^{+2}/\text{Sn}) + 0.0295 \log_{10}[\text{Sn}^{+2(aq)}]$$

$\text{Sn}^{+2}_{(aq)}$ සාන්ද්‍රණය 1.0 mol dm^{-3} අගයට වඩා අඩු වූ විට $\log_{10}[\text{Sn}^{+2(aq)}]$ යන්න සෘණ අගයක් ගන්නා හෙයින් $0.0295 \log_{10}[\text{Sn}^{+2(aq)}]$ යන්න ද සෘණ අගයක් වේ. $E^\circ(\text{Sn}^{+2}/\text{Sn})$ ද සෘණ අගයකි. එනිසා $E^\circ(\text{Sn}^{+2}/\text{Sn})$ සෘණව වැඩි වේ.

නමුත් $E_{\text{cell}} = E(\text{Cu}^{+2}/\text{Cu}) - E(\text{Sn}^{+2}/\text{Sn})$ නිසා $E(\text{Sn}^{+2}/\text{Sn})$ හි සෘණතාව වැඩි වන විට E_{cell} ධනතාව ඉහළ යයි. එනම් කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය වැඩිවේ.



① x 4 + ② x 3



පිට වූ O_2 මවුල සංඛ්‍යාව = $\frac{112 \text{ mol}}{22400}$

$\therefore$ සෑදුණ Al මවුල සංඛ්‍යාව $\frac{4}{3} = \frac{112 \times}{22400} \text{ mol}$

සෑදුණ Al ස්කන්ධය = $\frac{4 \times}{3} \times \frac{112}{22400} \text{ mol} \times 27 \text{ g mol}^{-1}$
= 0.188g

(ආ) ඉලෙක්ට්‍රෝඩ මවුලයක ආරෝපණය Q යැයි සිතමු.


O_2 1 mol සෑදීමේ දී ගලා යන ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණය = 4 mol

O_2 1 mol සෑදීමේ දී ගලා යන විද්‍යුත් ප්‍රමාණය = 4Q

O_2 $112/22400 \text{ mol}$ සෑදීමේ දී ගලා යන විද්‍යුත් ප්‍රමාණය = $\frac{112}{22400} \times 4Q$

නමුත් ගැලූ විද්‍යුත් ප්‍රමාණය = $3.21 \text{ A} \times 10 \times 60 \text{ S}$
= $3.21 \times 10 \times 60 \text{ C}$

$\therefore \frac{112}{22400} \times 4Q = 3.21 \times 10 \times 60 \text{ C}$
 $Q = 96300 \text{ C}$



ලත් M මවුල සංඛ්‍යාව = $\frac{1.373 \text{ g}}{137.3 \text{ g mol}^{-1}} = 0.01 \text{ mol}$

M හි 1 mol ක් විසර්ජනයට අවශ්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණය = $x \text{ mol}$

M හි 0.01 mol ක් විසර්ජනයට අවශ්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණය = $0.01x \text{ mol}$

අවශ්‍ය විද්‍යුත් ප්‍රමාණය = $0.01x \times 96500 \text{ C}$

$\therefore 0.01 \times 96500x = 3.21 \times 10 \times 60$

$x = 2$

(iii) $1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \times L = 96300 \text{ C mol}^{-1}$

$L = 6.0112 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

(iv) Y හි ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවයේ සෘණතාවය Fe වල සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවයේ සෘණතාවයට වඩා ඉහළය. $\therefore \text{Y}$ හා Fe සම්බන්ධ කළ විට Y ඔක්සිකරණය වෙමින් Fe වල විඛාදනය වළක්වයි. Y හි සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවයේ සෘණතාවය Fe වල සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවයේ සෘණතාවයට වඩා අඩුය. $\therefore \text{X}$ හා Fe සම්බන්ධ කළ විට Fe වල විඛාදනය වැඩිවේ.

මේ අනුව යකඩ විඛාදනය වැළැක්වීම සඳහා වඩා කාර්යක්ෂම වන්නේ Y ය.

07. (a) සංචාන පද්ධතියක ප්‍රතිවර්තය ප්‍රතික්‍රියාවක ඉදිරි සහ පසු ප්‍රතික්‍රියා වල වේගය සමාන වූ විට ප්‍රතික්‍රියාවේ රසායනික සමතුලිතතාවයක් තිබේ.

- (b) 303K දී

HOAc 10cm^3 සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන ලද NaOH මවුල ගණන

$$= \frac{0.15 \times 30.0}{1000} = 0.0045 \text{ mol}$$

නමුත් HOAc $1 \text{ mol} = \text{NaOH } 1 \text{ mol}$

$\therefore$ HOAc 10cm^3 ක අඩංගු මුළු මවුල ගණන

$$= 0.0045 \text{ mol}$$

$\therefore$ ජල තරලයෙහි අඩංගු මුළු මවුල ගණන,

$$= 0.0045 \text{ mol} \times 4 = 0.018 \text{ mol}$$

නමුත් ආරම්භයේ දී භාවිතා කරන ලද ඇසිටික් අම්ලයේ මවුල

$$= \text{mol} = 0.024 \text{ mol}$$

$\therefore$ කාබනික ස්ථරයේ අඩංගු ඇසිටික් අම්ලය

$$= 0.024 - 0.018$$

$$= 0.006 \text{ mol}$$

$$[\text{HOAc}]_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{0.0045}{10} \times 1000 = 0.45 \text{ mol l}^{-1}$$

$$[\text{HOAc}]_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{0.0045}{10} \times 1000 = 0.60 \text{ mol l}^{-1}$$

$$\frac{[\text{HOAc}]_{\text{H}_2\text{O}}}{[\text{HOAc}]_{\text{L}}} = \frac{0.45}{0.6} = 0.75$$

373K දී ජලීය ද්‍රාවණ 10.0cm^3 ක අඩංගු HOAc මවුල ගණන

$$= \frac{0.15 \times 29.5}{1000} \text{ mol} = 0.004425 \text{ mol}$$

$\therefore$ කාබනික ස්ථරයෙන් (10 mol) නිස්සරණය කරන ලද HOAc මවුල ගණන

$$= 0.0045 - 0.004425$$

$\therefore$ කාබනික ස්ථරයෙන් 30cm^3 නිස්සරණය කරන ලද මවුල ගණන

$$= 3 \times 0.000075 = 0.000225$$

$\therefore$ කාබනික ස්ථරයේ අඩංගු HOAc = 0.006225

$$\text{373K දී } \frac{[\text{HOAc}]_{\text{H}_2\text{O}}}{[\text{HOAc}]_{\text{L}}} = \frac{0.04425}{0.006225} = 0.71$$

- (c) t නම් කාලයක දී ඕනෑම ස්ථරයක $[\text{HOAc}]$ සොයන්න. කාලයකට පසුව එම ස්ථරයෙහිම $[\text{HOAc}]$ සොයන්න. අගයන් දෙකම සමාන නම් පද්ධතිය සමතුලිතතාවයෙහි තිබේ.

(C කොටස)

08. (a) (i) (අ) මූලද්‍රව්‍ය	Na	Mg	Al	P
ක්ලෝරයිඩය තුළ ඔ'කරණ අංකය	+1	+2	+3	+3
				+5


(ආ) සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ජලයේ දී මුළුමනින්ම විඝටනය වී පවතී.





මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් ද ජලයේ දී මුළුමනින්ම විඝටනය වී පවතී.



ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් ද ජල විච්ඡේදනය වී ආම්ලික ද්‍රාවණයක් සාදයි.




පොස්පරස් (iii) හා පොස්පරස් (v) ක්ලෝරයිඩ් මුළුමනින්ම ජල විච්ඡේදනය වී ප්‍රබල ආම්ලික ද්‍රාවණ සාදයි.




(ii) (අ) සෑදෙන කහපාට අවක්ෂේපය සල්ෆර් විය යුතුය.

$$\begin{aligned} \text{ගත් } \text{S}_2\text{Cl}_2 \text{ මවුල සංඛ්‍යාව} &= \frac{1.00\text{g}}{1359\text{mol}^{-1}} = 0.0074 \text{ mol} \\ \text{සෑදුණ S මවුල සංඛ්‍යාව} &= \frac{0.369}{32\text{gmol}^{-1}} = 0.01125 \text{ mol} \\ \text{S}_2\text{Cl}_2 \text{ හා S අතර මවුල අනුපාතය} &= 0.0074 : 0.01125 \\ &= 1 : 1.52 \\ &= 2 : 3 \end{aligned}$$

තුලිත සමීකරණය




$$\begin{aligned} \text{(ආ) } \text{S}_2\text{Cl}_{2(l)} \text{ 0.0074 mol න් ලැබෙන } \text{H}_2\text{SO}_3 \text{ ප්‍රමාණය} &= \frac{0.0074 \text{ mol}}{0.037} \\ &= 0.037 \text{ mol} \end{aligned}$$



$$\text{H}_2\text{SO}_3 \text{ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා වන NaOH ප්‍රමාණය} = 2 \times 0.0037 \text{ mol}$$


$$\begin{aligned} \text{S}_2\text{Cl}_2 \text{ 0.0074 mol න් ලැබෙන HCl ප්‍රමාණය} &= 2 \times 0.0074 \text{ mol} \\ &= 0.0148 \text{ mol} \end{aligned}$$




$$\text{සෑදෙන HCl සමඟ ප්‍රතික්‍රියා වන NaOH ප්‍රමාණය} = 0.0148 \text{ mol}$$

$$\begin{aligned} \text{වැයවන මුළු NaOH ප්‍රමාණය} &= (0.0037 \times 2 + 0.0148) \text{ mol} \\ &= 0.0222 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NaOH ද්‍රාවණයේ පරිමාව} &= \quad \times 0.022 \text{ cm}^3 \\ &= \frac{1000}{22.4} \text{ cm}^3 \end{aligned}$$



(ii) Ni : Ag අතර මවුල අනුපාතය නම්,



$$21.594x + 39.528 = 23.478x + 31.992$$

$$1.884x = 7.536$$

$$\therefore x = 4$$

$$\therefore \frac{59x + 108}{91x + 124} = \frac{0.258}{0.366}$$

ලඝු ගණක යොදා ගන්නේ නම්, $x = 3.99$)

$$\therefore \text{Ni වල මවුල භාගය} = \frac{4}{(4+1)} = 0.8$$

09. (a) (i) ඉලෙක්ට්‍රෝන සන්නිවේදන වැඩි ප්‍රභේදයක්, එනම්, එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් සහිත ප්‍රභේදයක් ඉලෙක්ට්‍රෝන උෞන ප්‍රභේදයක් මග එම ඉලෙක්ට්‍රෝනය හවුලේ තබා ගනිමින් දායක සහසංයුජ බන්ධනයක් ගොඩනගා ගෙන නව අයනයක් සැදුවොත් එය සංකීර්ණ අයනයක් වේ.


(ii) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9$

(iii) $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+2}$

(iv) (1) $[\text{CuCl}_4]^{2-}$, +2








(2) ඔක්සිභාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම.




(3) $[\text{CuCl}_2]^-$ තුළ පවතින්නේ Cu^+ අයනයකි. එය තුළ අඩක් පිරුණු d උප ශක්තිමට්ටමක් නැත. $\therefore [\text{CuCl}_2]^-$ අවර්ණය.



- (b) රතු ලිට්මස් කැබැල්ලක් බැගින් මේ සෑම ද්‍රාවණයකටම දමන්න. එවිට රතු ලිට්මස් නිල් පැහැ වන්නේ NaOH සහ K_2CO_3 ද්‍රාවණ වලිනි. ඉන්පසු මේ ද්‍රාවණ දෙකෙහි කොටස්වලට වෙන වෙනම තනුක HCl එකතු කරන්න. එවිට වායු බුබුළු පිටවන්නේ වලිනි. අනෙක NaOH ය. NaOH ද්‍රාවණයෙන් කොටසක් ගෙන ඉතිරි ද්‍රාවණ 4 හි කොටස් වලට වෙන වෙනම ක්‍රමයෙන් හා වැඩිපුර එක් කරන්න. එවිට ඇමෝනියා ගන්ධය නිකුත්වන නළයේ ඇත්තේ $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ය. NaOH එක් කිරීමේ දී අවක්ෂේපයක් ලැබී වැඩිපුර එක්කිරීමේ දී අවක්ෂේපය දිය වන්නේ ZnSO_4 වලය. NaOH වැඩිපුර එක් කළ ද දිය නොවන අවක්ෂේපයක් NaOH සමඟ ලබා දෙන්නේ MgCl_2 ය. NaOH සමඟ අවක්ෂේපයක් ලබා නොදෙන්නේ BaCl_2 ය.

- (c) (i) HClO_4 වල ප්‍රෝටෝන දායක බලය HNO_3 වලට වඩා වැඩිය. $\therefore \text{HNO}_3$ වලට H^+ අයනයක් ලබාදෙමින් $\text{H}_2\text{N}^+\text{O}_3$ හා ClO_4^- අයන සාදයි.





හෝ



හෝ



(iii) ප්‍රතික්‍රියා කළ 2KMnO_4 ප්‍රමාණය $= 25 \times \frac{0.02}{1000} \text{ mol}$

ද්‍රාවණයේ ඇති Fe^{+2} ප්‍රමාණය $= 25 \times \frac{0.02}{1000} \times 5 \text{ mol}$

විඛාදනය වූ 0.3g වන යකඩ ඇණයෙහි ඇති පිරිසිදු Fe ස්කන්ධය $= 25 \times \frac{0.1}{1000} \times 56\text{g}$

විඛාදනය වූ ඇණයෙහි මලකඩ ලෙස පවතින Fe_2O_3 ස්කන්ධය $= 0.3 - 25 \times \frac{0.1}{1000} \times 56\text{g}$
 $= 0.30 - 0.14$
 $= 0.16\text{g}$

මලකඩ ලෙස පවතින Fe මවුල ප්‍රමාණය $= \frac{2 \times 0.16}{160}$


මලකඩ ලෙස පවතින Fe ස්කන්ධය $= \frac{160}{x} \times 56\text{g}$

විඛාදනය වීමට ප්‍රථම යකඩ ඇණයෙහි ස්කන්ධය

$$= \left[\frac{2 \times 0.16 \times 56}{160} + \frac{25 \times 0.1 \times 56}{1000} \right] \text{g}$$

$$= 0.112 + 0.14\text{g}$$

$$= 0.252\text{g}$$



(ii) පුළුන් පේනුවක් සහිත කැකැරුම් නළයක්

රූප සටහනක් හෝ උපකරණ පිළිබඳ විස්තරයක්

KMnO_4 වලින් වියළි දන්නා බරක් රත් කිරීම.

ජල මට්ටම් සමාන කර පරිමාව මැනීම.

වාත රෝධක පද්ධතියක් භාවිතය.

රත් කළ පසු නැවත බර කිරීම.

කාමර උෂ්ණත්වය හා පීඩනය සටහන් කර ගැනීම.

(iii) පිටවූ O_2 පරිමාව STP වලට පරිවර්තනය කිරීම.

O_2, X_{g} වල STP වල දී පරිමාව $= V$

$\therefore \text{O}_2, 32\text{g}$ ක STP වල දී පරිමාව $= \quad \times 32$